

登 録 速 報

農 薬 名：ポリオキシシリンAL水和剤（登録番号：第 9019 号）

適用拡大登録月日：平成24年9月12日

適用拡大登録内容：

- ① 作物名「たまねぎ」の適用病害名「灰色かび病」に希釈倍数「750 倍」を追加する。
- ② 作物名「りんご」「なし」「ぶどう」及び「みかん」の使用液量を「200～700L/10a」とする。
- ③ 作物名「メロン」「きゅうり」「いちご」「トマト」「レタス」「にんじん」「ねぎ」及び「たまねぎ」の使用液量を「100～300L/10a」とする。
- ④ 作物名「からまつ」の使用液量を「300～700L/10a」とし、本剤の使用回数及びポリオキシシリンを含む農薬の総使用回数を「8 回以内」とする。

（変更後）全内容

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ポリオキシシリンを含む農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病 うどんこ病 褐斑病 赤衣病	1000 倍	200～700 L/10a	収穫 3 日前まで	3 回以内	散布	5 回以内 (散布は 3 回以内)
なし	黒斑病 うどんこ病 褐色斑点病			収穫 7 日前まで	5 回以内		5 回以内 (イミダジン酢酸塩・ ポリオキシシリン水和剤は 3 回以内)
ぶどう	灰色かび病	収穫 30 日前まで	5 回以内	5 回以内			
みかん	赤衣病	収穫 14 日前まで		5 回以内			
メロン	うどんこ病	500～1000 倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	2 回以内		5 回以内 (塗布は 1 回以内)
きゅうり				2 回以内			2 回以内
いちご	灰色かび病 うどんこ病	1000 倍	100～300 L/10a	収穫開始 14 日前まで	3 回以内		3 回以内
トマト	灰色かび病 葉かび病			収穫前日まで			
レタス	菌核病	500 倍	100～300 L/10a	収穫 14 日前まで	5 回以内		5 回以内
にんじん	黒葉枯病			収穫 7 日前まで			
ねぎ	黒斑病	1000 倍	100～300 L/10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	3 回以内	
たまねぎ	灰色かび病	500～750 倍		収穫 3 日前まで	5 回以内	5 回以内	
からまつ	先枯病	500～1000 倍	300～700 L/10a	—	8 回以内	8 回以内	

注意事項の変更：なし

以 上