

登 録 速 報

農 業 名：ファンタジスタ顆粒水和剤（登録番号：第 23102 号）

適用拡大登録月日：平成25年3月27日

適用拡大登録内容：

- ① 作物名「りんご」の適用病害名「黒点病」「輪紋病」の希釈倍数「3000 倍」を「3000～4000 倍」に変更する。希釈倍数「3000 倍」に適用病害名「うどんこ病」を追加する。
- ② 作物名「おうとう」に適用病害名「褐色せん孔病」を追加する。
- ③ 作物名「なし」の適用病害名「黒斑病」「輪紋病」の希釈倍数「3000 倍」を「3000～4000 倍」に変更する。希釈倍数「3000～4000 倍」に適用病害名「心腐れ症(胴枯病菌)」を、希釈倍数「3000 倍」に適用病害名「炭疽病」を追加する。
- ④ 作物名「ぶどう」の適用病害名「晩腐病」の希釈倍数「3000 倍」を「3000～4000 倍」に変更する。希釈倍数「3000～4000 倍」に適用病害名「黒とう病」を追加する。
- ⑤ 作物名「かんきつ」の適用病害名「灰色かび病」の希釈倍数「3000～4000 倍」を「2000～4000 倍」に、適用病害名「黒点病」の希釈倍数「2000 倍」を「2000～4000 倍」に変更する。
- ⑥ 作物名「茶」の使用液量「100～400L/10a」を「200～400L/10a」に変更する。
- ⑦ 作物名「たまねぎ」の希釈倍数「2000～4000 倍」に適用病害名「小菌核病」を追加する。

（変更後）変更作物のみ

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病 モニリア病、褐斑病 斑点落葉病、すす点病 黒点病、輪紋病	3000～ 4000 倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
	すす斑病、うどんこ病	3000 倍					
おうとう	灰星病、幼果菌核病 褐色せん孔病	3000 倍					
なし	黒星病、黒斑病 輪紋病 心腐れ症(胴枯病菌)	3000～ 4000 倍					
	炭疽病	3000 倍					
ぶどう	灰色かび病、晩腐病 黒とう病	3000～ 4000 倍					
かんきつ	灰色かび病 そうか病 黒点病	2000～ 4000 倍					
茶	炭疽病、輪斑病 新梢枯死症	3000 倍	200～400 L/10a	摘採 7 日前 まで	1 回	1 回	
たまねぎ	灰色かび病 小菌核病	2000～ 4000 倍	100～200 L/10a	収穫前日 まで	5 回以内	5 回以内	
	灰色腐敗病	2000～ 3000 倍					

注意事項の変更：

【変更前】

- 使用量に合わせて薬液を調製し、使い切ること。
- 適用作物群に属する作物または新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。尚、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【変更後】

- 使用量に合わせて薬液を調製し、使いきること。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

以 上