

登 録 速 報

農 薬 名：クミアイ ナブ乳剤（登録番号：第 16225 号）

適用拡大登録月日：平成25年10月23日

適用拡大登録内容：

- ①作物名「てんさい」の適用雑草名「一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)」における使用時期「雑草生育期イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 60 日前まで」の希釈水量「25～150L/10a」を「100～150L/10a」に変更する。**(制限登録)**
- ②作物名「あずき」「いんげんまめ」「やまのいも」の使用時期に「イネ科雑草 6～8 葉期」を追加する。
- ③作物名「ばれいしょ」の使用時期「但し収穫 14 日前まで」を「但し収穫前日まで」に変更する。

(変更後) 変更作物のみ

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	セキジウムを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
てんさい	—	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)	育苗期の雑草生育期イネ科雑草 1～3 葉期 但し収穫 60 日前まで	150～300 ml/10a (0.3～0.6ml/ヘーパーホット 6 冊)	150L/10a (300ml/ヘーパーホット 6 冊)	2 回以内	雑草茎葉散布	全域	2 回以内
			雑草生育期イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 60 日前まで	200ml/10a	100L/10a				
		レドトップシバムギ	雑草生育期イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 60 日前まで	150～200ml/10a 300～400ml/10a	100～150 L/10a				

(変更後) 変更作物のみ

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	セトキシムを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
あずき		一年生 イネ科雑草 (スズメカサビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 14 日前まで	150～200 ml/10a	100～150 L/10a	2 回 以内	雑草茎葉 散布	東北 以北	2 回以内
			雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 14 日前まで	200ml/10a	100L/10a			北海道	
いんげんまめ			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 14 日前まで	150～200 ml/10a	100～ 150L/10a	1 回		全域	
			雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 14 日前まで	200ml/10a					
やまのいも			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 60 日前まで	150～200 ml/10a		2 回 以内			2 回以内
			雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 60 日前まで	200ml/10a					
ばれいしょ			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫前日まで	150～200 ml/10a	2 回 以内	2 回以内			北海道
			雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫前日まで	200ml/10a					

注意事項の変更：

【削除事項】

- てんさいについて、10 アール当りの使用液量を 25～50L で散布する場合、少水量散布に適合したノズルを使用すること。
- イネ科雑草の生育期に有効であるが、雑草が大きくなりすぎると効果が劣ることがあるので時期を失しないよう均一に散布すること。

【追加事項】

- 本剤は自動車などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意すること。

以上