

登 録 速 報

農 薬 名：クミアイベフラン液剤25（登録番号：第 15649 号）

適用拡大登録月日：平成26年6月11日

適用拡大登録内容：

- 作物名「小麦」に適用病害虫名「紅色雪腐病」の使用方法「散布」に希釈倍数「250倍」（使用液量「25L/10a」、使用時期「根雪前」）を追加する。

【変更後】変更作物のみ

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミノクジンを 含む農薬の 総使用回数
小麦	雪腐大粒菌核病 紅色雪腐病	1000倍	60～ 150L/10a	根雪前	3回以内 (但し、 出穂期 以降は 1回以内)	散布	4回以内 (種子への処理 は1回以内、 散布及び無人 ヘリ散布は合計 3回以内、 出穂期以降は 1回以内)
	うどんこ病			収穫14日 前まで			
	赤かび病	1000～ 2000倍					
	紅色雪腐病	250倍	25L/10a	根雪前	1回	塗沫処理	
		10倍	乾燥種子 1kg当り 30～50mL	は種前			
		5倍	乾燥種子 1kg当り 15～25mL				
	紅色雪腐病 条斑病 ふ枯病	原液	乾燥種子 1kg当り 3～5mL			種子吹き付 け処理又は 塗沫処理	
なまぐさ黒穂病	1000～ 2000倍	—			10～30分間 種子浸漬		

【注意事項の追加】

- 本剤を小麦に対して希釈倍数250倍で使用する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を用いて均一に散布すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

以 上