

登 録 速 報

農 薬 名：クミアイコテツフロアブル（登録番号：第 19185 号）

適用拡大登録月日：平成26年8月6日

適用拡大登録内容：

- 適用病害虫名の変更：かんきつ/ミカンキロザミマ, 2000～4000 倍、チャノキロザミマ, 4000～6000 倍
⇒ アザミマ類(ネギアザミマを除く)、2000～6000 倍
- 適用病害虫名の追加：りんご/ミノガ類(2000 倍)、ねぎ、にんじん/ヒョウタンゾウムシ類(2000 倍)、かんしょ/ヨツモンカメノコハムシ(2000 倍)

【変更後】（変更作物のみ）

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェニルを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ヨモギエダシヤク	2000～4000 倍	200～700 L/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内
	アザミマ類 (ネギアザミマを除く)	2000～6000 倍					
	チャノホコリダニ ミカンサビダニ	4000～6000 倍					
	ハスモンヨトウ リュウキュウミカンサビダニ カナタキ スガリゾウムシ	4000 倍					
りんご	キンモンホリガ ナミハダニ ハマキムシ類 ミノガ類	2000 倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
	ヨモギエダシヤク リンゴサビダニ	2000～4000 倍					
にんじん	ヨトウムシ ヒョウタンゾウムシ類	2000 倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
ねぎ	シロイモジヨトウ ヒョウタンゾウムシ類						
かんしょ	ハスモンヨトウ ハダニ類 ヨツモンカメノコハムシ						

注意事項の変更：なし

以 上