

# 登録速報

農薬名：クミアイバサグラン粒剤（ナトリウム塩）（登録番号：第 16123 号）

適用拡大登録月日：平成27年9月30日

適用拡大登録内容：

- 作物名「移植水稻」及び「直播水稻」の適用土壌と適用地帯の区分を削除する。
- 作物名「移植水稻」の適用雑草名「水田一年生雑草(イ科を除く)、マツバ、ホトメ、ウリカ、ミスガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ」「クログワイ」「エゾノササカゲサ」「シズイ」の使用時期を「移植後15～55日 但し 収穫60日前まで」に変更する。
- 作物名「直播水稻」の使用時期を「稲3葉期～入水50日後 但し収穫60日前まで」に変更する。

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ベンゾジオンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 (イ科を除く) マツバ ホトメ ウリカ ミスガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ クログワイ エゾノササカゲサ シズイ	移植後15～55日 但し 収穫60日前まで	3～4 kg/10a	1回	落水散布又は ごく浅く湛水 して散布	2回以内
直播水稻	水田一年生雑草 (イ科を除く) マツバ ホトメ ウリカ ミスガヤツリ ヘラオモダカ	稲3葉期～ 入水50日後 但し 収穫60日前まで	3kg/10a			

注意事項の変更：

【変更後】

- 本剤は水の移動に伴う移行性が大きく、一般に水深の浅いほど効果が安定する。
- 使用にあたっては落水状態（足跡に水が残っている状態）にして水の出入りをとめ、まきむらのないよう均一に散布すること。
- 水を落とすことができないところでは漏水のない水田に限り、できるだけ浅水状態（雑草が水面上に出る状態）にしてまきむらのないよう均一に散布すること。

- 散布後少なくとも3日間(浅水処理は5日間)はそのままの状態を保ち、入水、落水、かけ流しはしないこと。また、散布後7日間は降雨の有無にかかわらず落水しないこと。
- 処理後2日以内に降雨があると効果が不十分になるおそれがあるので、晴天の持続する時を選んで使用すること。
- 深水にすると効果が劣るので注意すること。
- イネ科雑草には効果が劣るので、田植前後の土壌処理除草剤で一年生雑草を防除した後、多年生水田雑草及び一年生広葉雑草の防除を目的として使用すること。
- 砂質土及び漏水のはげしい水田では使用しないこと。(減水深2cm/日以上)
- 本剤は生育期に入った雑草に効果があるが、雑草、特に多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので必ず適期に散布すること。ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカでは発生盛期から増殖中期、オモダカでは発生盛期から発生揃期まで、クログワイでは草丈15cm以下、エゾノサヤヌカグサでは1～4葉期、シズイでは草丈10～30cmが本剤散布の適期である。
- クログワイ防除は、必要に応じて有効な前処理剤との組み合わせで使用すること。
- 本剤の使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

以 上