

登 録 速 報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

記

農 薬 名：ベンレート水和剤（登録番号：第20889号）（住友化学(株)登録）

適用拡大登録月日：平成29年1月11日

適用拡大登録内容：

- 作物名「らっかせい」の希釈倍数「2000倍」に適用病害虫名「茎腐病」を追加する。
- 作物名「なす」の使用方法「散布」、希釈倍数「2000倍」に適用病害虫名「褐紋病」を追加する。
- 作物名「かき」に適用病害虫名「疑似炭疽病」、希釈倍数「2000倍」を追加する。
- 作物名「かのこそう」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 または 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	ペ/ミル を含む 農薬の 総使用回数
らっかせい	褐斑病 黒渋病	2000～ 3000 倍	100～300 L/10a	収穫7日前 まで	4回以 内	散布	5回以内 (種子粉衣 は 1回以内、 は種後は 4回以内)
	そうか病 茎腐病	2000 倍					
なす	半身萎凋病	500 倍	200～300 mL/株	定植後～ 収穫14日 前まで	3回以 内	土壌灌注	4回以内 (種子粉衣 は 1回以内、 は種後は 3回以内)
		1000 倍	400～600 mL/株				
	黒枯病 灰色かび病 菌核病 褐紋病	2000～ 3000 倍 2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで		散布	
かき	落葉病 うどんこ病 炭疽病 すす点病	2000～ 3000 倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで	6回以 内	散布	6回以内
	疑似炭疽病	2000 倍					
かのこそう	半身萎凋病	160 倍	—	植付前	1回	30分間 苗浸漬	1回

注意事項の変更：

なし

以 上