

水稻殺菌剤

ラテラ[®]粉剤DL

®:クミアイ化学工業(株)の登録商標

2つの成分で、
しっかりブロック!



いもち病(穂いもち)



稲こうじ病



変色米



穂枯れ(ごま葉枯病菌)



内穎褐変病

自然に学び自然を守る



特長 2つの有効成分の働きで、稲の主要病害をしっかりと防除できます。

トリシクラゾール (ビーム)

いもち病菌の侵入を防ぎ、安定した予防効果を示します。



イミノクタジン酢酸塩

広い抗菌スペクトラムと穂枯れ性病害に優れた予防・保護効果を示します。


適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	10アール当り 使用量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	イミノクタジンを含む 農薬の総使用回数	トリシクラゾールを含む 農薬の総使用回数
稲	いもち病 稲こうじ病 変色米 (カーブラリア菌)	3~4kg	収穫 14日前 まで	3回以内	散布	3回以内	4回以内 (育苗箱への 処理は1回以内、 本田では3回以内)
	穂枯れ (ごま葉枯病菌) 内穎褐変病 変色米 (アルタナリア菌)	4kg					

上手な使い方

- ① いもち病発生に際して予防的に散布した方がより効果的です。
- ② 葉いもち病に対して発生が予想される場合、又は初発生をみたら直ちに散布してください。
- ③ 穂いもち病、穂枯れに対しては、穂ばらみ期と穂揃い期の2回散布が効果的です。

ラテラ粉剤DLの散布時期



使用上の注意



- 野菜類及びなし(二十世紀、幸水、新水等)、もも、うめ等の果樹には、かからないように注意してください。
- 各有効成分ごとの総使用回数の範囲内で使用してください。
- 桑に付着するおそれがある地区では使用しないでください。
- 散布器具、作業衣などは桑用と必ず区別してください。
- 眼に刺激性がありますので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 散布の際は保護眼鏡、農業マスクなどを着用してください。
- 作業後は洗眼・うがいをしてください。
- かぶれやすい人は、取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼしますので、河川、養殖池等に飛散、流入しないように注意してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 保管…密封し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼・乾燥した場所に保管してください。

殺菌防除スペクトラム (効果が期待できる主要病害)

病害虫名	いもち病	穂枯れ	変色米	内穎褐変病	稲こうじ病
成分・剤名					
トリシクラゾール	○	○			
イミノクタジン酢酸塩		○	○	○	○
ラテラ粉剤DL	○	○	○	○	○

本資料の記載内容は2008年1月現在のものです。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。● 防除日誌を記帳しましょう。

0020 (08-2)



自然に学び 自然を守る

クミアイ化学工業株式会社

本社：東京都台東区池之端1-4-26 〒110-8782 TEL03-3822-5036
ホームページアドレス <http://www.kumiai-chem.co.jp>