

星の女神の除草剤

ノビエ・コナギ・ホタルイに高い効果



水稲用初・中期一発処理除草剤

カニスター[®]

フェノキサスルホン・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル剤

1キロ粒剤51

L豆つぶ[®]250

Lジャンボ[®]

Lフロアブル



新規ヒエ剤「フェノキサスルホン」配合

- ノビエに対し、高い効果と長期残効を示します
- 一年生広葉雑草の後発生を抑えます



®は登録商標です。

有効成分

1キロ粒剤51 ●フェノキサスルホン (2.0%),プロモブチド (9.0%), ベンシルフロンメチル (0.51%)
 L豆つぶ250 ●フェノキサスルホン (8.0%),プロモブチド (36.0%),ベンシルフロンメチル (2.0%)
 Lジャンボ ●フェノキサスルホン (8.0%),プロモブチド (36.0%),ベンシルフロンメチル (2.0%)
 Lフロアブル ●フェノキサスルホン (3.7%),プロモブチド (16.5%), ベンシルフロンメチル (0.90%)

人畜毒性 普通物 (劇毒物に該当しないものを指している通称)

- 特長**
 - 新規有効成分「フェノキサスルホン」により2.5葉期までのノビエに卓効を示し、またノビエや一年生広葉雑草(コナギ・アゼナ類)に長期残効を示します。
 - プロモブチドを10アールあたり90g配合し、抵抗性イヌホタルイにも安定した効果を示します。
 - 4剤型(1キロ粒剤・豆つぶ剤・ジャンボ剤・フロアブル剤)が揃っており、使用方法に合わせてお使いいただけます。

適用雑草及び使用方法

1キロ粒剤51 農林水産省登録第23531号

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール 当り使用量	本剤の 使用回数	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、 ミズガヤツリ、オモダカ、クログワイ ヒルムシロ、セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後3日～ ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	1kg	1回※	湛水散布

L豆つぶ250 農林水産省登録第23539号

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール 当り使用量	本剤の 使用回数	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ウリカワ ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	移植後3日～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	250g	1回※	湛水散布、湛水周縁散布 又は 無人航空機による散布
直播水稲		稲1葉期～ノビエ2.5葉期 但し、収穫90日前まで			湛水散布 又は 無人航空機による散布

Lジャンボ 農林水産省登録第23542号

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール 当り使用量	本剤の 使用回数	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ウリカワ ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	移植後3日～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	小包装(パック) 10個(250g)	1回※	水田に小包装 (パック)のまま 投げ入れる
直播水稲		稲1葉期～ノビエ2.5葉期 但し、収穫90日前まで			

Lフロアブル 農林水産省登録第23546号

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール 当り使用量	本剤の 使用回数	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ウリカワ ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	移植後3日～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	500ml	1回※	原液湛水散布

※各有効成分を含む農薬の総使用回数:フェノキサスルホン…2回以内、プロモブチド…2回以内、ベンシルフロンメチル…2回以内

上手な使い方
(移植水稲)

標準的な
使用時期



●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。 ●防除日誌を記帳しましょう。

本資料は2018年12月現在の知見に基づいて作成しております。