殺虫剤　みかん・かんきつ・畑作物の害虫対策に

自然に学び自然を守る
クミカ

# ダーズバン™ 乳剤40

## みかん・かんきつ・畑作物の害虫防除に。

ダーズバンは、かんきつおよび畑作物の重要害虫である
ヤノネカイガラムシ、アブラムシ類、ヨトウムシなどに
優れた速効性と安定した効果を発揮します。
防除体系に上手に組み入れて、
効率的な害虫防除にお役立てください。

DURSBAN／ダーズバンは登録商標

登録番号:第14129号　有効成分:クロルピリホス･･･40.0%　性状:淡黄色透明可乳化油状液体　人畜毒性:医薬用外劇物　包装:500㎖×20本　有効期限:5年

## ●ダーズバン乳剤40の主な特長

**1.幅広い害虫に安定した効果**

**2.接触毒および食毒により、速効的な効果を発揮**

**3.散布コストが安く、経済的な防除が可能**

## ●適用害虫と使用方法

※本剤およびクロルピリホスを含む農薬の総使用回数

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数(倍) | 10アールあたりの使用液量(ℓ) | 使用時期 | 使用方法 | 使用回数※ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| みかん(露地栽培) | ハマキムシ類、アブラムシ類 | 1,500 | 200～700 | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 |
| | ヤノネカイガラムシ若齢幼虫、コナカイガラムシ類、クワゴマダラヒトリ幼虫 | 1,000 | | | | |
| | カミキリムシ類幼虫 | 100 | 20～70 | | 樹幹散布 | |
| かんきつ(みかんを除く) | ハマキムシ類、アブラムシ類 | 1,500 | 200～700 | 収穫60日前まで | 散布 | 1回 |
| | ヤノネカイガラムシ若齢幼虫、コナカイガラムシ類、クワゴマダラヒトリ幼虫 | 1,000 | | | | |
| てんさい | ヨトウムシ、カメノコハムシ アブラムシ類 | 1,500 | 100～300 | 収穫45日前まで | | 2回以内 |
| だいず | ハスモンヨトウ、マメシンクイガ | | | 収穫7日前まで | | |
| ばれいしょ | アブラムシ類 | | | | | |
| たまねぎ | ネギアザミウマ | 1,000～1,500 | | 収穫21日前まで | | |
| 茶 | チャハマキ チャノコカクモンハマキ | | 200～400 | 摘採14日前まで | | |
| | クワシロカイガラムシ | 1,000 | 1,000 | | | |

## ●試験成績

かんきつのヤノネカイガラムシに対する効果　愛媛県農林水産研究所果樹研究センター 2017年

| 供試薬剤 | 希釈倍数(倍) | 補正死虫率(%) |
|---|---|---|
| ダーズバン乳剤40 | 1,500 | 95.7 |
| G乳剤 | 1,500 | 100 |

品種:白柳ネーブル　発生:中発生　散布月日:6月22日　調査月日:7月19日

ばれいしょのアブラムシ類に対する効果　北海道立北見農業試験場 1998年

| 供試薬剤 | 希釈倍数(倍) | 防除価 |
|---|---|---|
| ダーズバン乳剤40 | 1,500 | 89 |
| D水和剤 | 1,000 | 78 |
| 無散布 | ― | 0 |

対象害虫:ジャガイモヒゲナガアブラムシ　発生:中→大　品種:男爵いも
散布月日:平成10年7月4日　調査月日:7月16日

### ⚠ 使用上の注意

●石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性薬剤とは混用しないでください。
●ヤノネカイガラムシに対しては、発育が進むと効果が落ちるので若齢幼虫期に散布してください。
●かんきつに対し、施設内で使用すると薬害のおそれがあるので、施設内での散布はしないでください。
●だいずの新葉に散布した場合、変色等の薬害を生じるおそれがあるので注意してください。散布後の新たな展開葉には影響は認められておりません。
●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
●ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
・ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
・受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では、使用をさけてください。
・関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているか確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
●本剤は、自動車などに散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意してください。

### ⚠ 安全使用上の注意

●医薬用外劇物 取扱いには十分注意してください。
誤って飲み込んだ場合には、吐かせないで直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
●原液は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
●本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
●散布の際は、防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
●作業時に着用していた衣服等は他の物とは分けて洗濯してください。
●かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
治療法…硫酸アトロピン製剤の投与が有効(動物実験で報告。)
魚毒性等…水産動植物(魚類、甲殻類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼、海域及び養殖池に本剤が飛散、流入するおそれのある場所では使用しないでください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
保管…密栓し、火気をさけ、食品と区別して、直射日光の当たらない冷涼な所にカギをかけて保管してください。盗難、紛失の際には警察に届け出てください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。　●ラベルの記載以外には使用しないでください。　●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
●空容器は圃場等に放置せず、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。　●防除日誌を記帳しましょう。

JAグループ 農協 全農 経済連
全農は登録商標　第4702318号

◎本資料は2019年11月現在の知見に基づき作成されています。

販売 自然に学び 自然を守る
クミアイ化学工業株式会社
〒110-8782 東京都台東区池之端1-4-26 ☎03(3822)5036
https://www.kumiai-chem.co.jp

1772(20-1)