

豊かな収穫へ行進!!

新登場

果樹用殺菌剤

パレード15 ゴアザル

適用
拡大



写真イメージです



黒星病・輪紋病など

幅広い病害に高い効果を発揮!! 適用作物への薬害リスクが極めて低い!



りんご/黒星病



りんご/モニリア病



りんご/うどんこ病



りんご/褐斑病



なし/輪紋病



ぶどう/黒とう病

®は日本農業(株)の登録商標

自然に学び 自然を守る



特長

パレード15フロアブルは新規有効成分「ピラジフルミド」を含有する果樹用SDHI殺菌剤です。

■幅広い病害スペクトラムを有します

黒星病、輪紋病、褐斑病、うどんこ病、灰星病等、幅広い病害に対し高い効果を示します。

■効果持続性に優れます

降雨の影響を受けにくく、また葉内への浸透性を有し効果持続性に優れます。

■適用作物への薬害リスクが低く、使いやすい薬剤です

適用作物に対する薬害リスクが低く、これまでの試験では適用作物への薬害発生事例はありません。幅広い作物で栽培期間を通して使いやすい薬剤です。

適用病害虫および使用方法

が2021年7月に適用拡大になりました

2021年7月現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病、斑点落葉病、輪紋病 すす点病、すす斑病、うどんこ病 褐斑病、灰色かび病、黒点病 モニリア病	2000～3000倍	200～700ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	赤星病	2000倍					
おうとう	灰星病	2000～3000倍					
	幼果菌核病	2000倍					
なし	黒星病、輪紋病 うどんこ病、赤星病	2000～3000倍					
	黒斑病	2000倍					
もも ネクタリン	灰星病、黒星病	2000～3000倍					
	うどんこ病	2000倍					
小粒核果類	すす斑病（うめ）	2000倍					
	黒星病、灰色かび病 灰星病（すもも）	2000～3000倍					
ぶどう	黒とう病、さび病 灰色かび病、褐斑病	2000～3000倍	収穫7日前まで				
かき	うどんこ病、落葉病		収穫前日まで				
かんきつ	灰色かび病、そうか病		収穫7日前まで				

注意事項

- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
- ぶどうの幼果期（小豆大）以降の散布は、果粉が溶脱するおそれがあるので使用をさけてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましく、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。

- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。