

幅広い作物に使えて、
幅広い害虫に効く。



クミアイ

アドマイヤー®

顆粒水和剤



ワタアブラムシ



モモアカアブラムシ



オンシツコナジラミ



ミナミキイロアザミウマ



チャノキイロアザミウマ



チャバネアオカメムシ



製品情報の詳細は
こちらから



使いたい時に使えるコンパクトな密閉ボトル。
農地規模・散布時期、作物にあわせた使用が可能です。
アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類などに長い防除効果があります。

使いたい分量が、ラクラク計れる計量カップ付。5,000~10,000倍の高希釈タイプ。小容量から大容量までカップ1つで自由自在。

例えば
20g → 200ℓ
10,000倍希釈



組み合わせての計量OK!



1g



2g



5g



10g



20g



50g

自然に学び自然を守る



クミカ

適用害虫および使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期*	使用回数*		使用方法
					本剤	イミダクロプリド	
稲 (箱育苗)	ウンカ類 ツマグロヨコバイ	250~500	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ)1箱当り0.5ℓ	移植 2日前~ 移植当日	1回	3回(移植時までの処理は1回、本田での散布は2回)	灌 注
	イネミズウムシ イネドクオウムシ	250~1,000	種もみ 4~8kg当り 30~40g (40g/10aまで)				
乾田直播 水稻	ウンカ類	—	種もみ 4~8kg当り 30~40g (40g/10aまで)	は種前	1回	3回(は種時までの処理は1回、本田での散布は2回)	種子塗沫 (未催芽粉)
湛水直播 水稻							
かんざつ	アブラムシ類 ミカンハモグリガ コマダラカミキリ成虫 コナカイガラムシ類 アカマルカイガラムシ コナジラミ類 アザミウマ類 カメムシ類	5,000~10,000	200~700 ℓ/10a	14日 *1	3回	3回	散 布
	げっさつ	ミカンキジラミ		5,000	発生初期 *1	4回	
りんご	カメムシ類 リンゴツタムシ	5,000~15,000	200~700 ℓ/10a	3日 *1	2回	2回	散 布
	うめ すもも	アブラムシ類		10,000			
なし	アブラムシ類 カメムシ類	5,000~10,000	200~700 ℓ/10a	3日 *1	2回	2回	散 布
	もも	アブラムシ類 モモハモグリガ カメムシ類		5,000~10,000			
ぶどう	アザミウマ類 フタテンヒメコバヤ	5,000~10,000	200~700 ℓ/10a	21日 *1	3回	3回	散 布
かき	アザミウマ類 カメムシ類	5,000~10,000	200~700 ℓ/10a	7日 *1	3回	3回	散 布
マンゴー	アザミウマ類	5,000~10,000	200~700 ℓ/10a	14日	2回	2回	散 布
パッションフルーツ	アザミウマ類	5,000~10,000	200~700 ℓ/10a	7日	2回	2回	散 布
アテモヤ	アザミウマ類	5,000~10,000	200~700 ℓ/10a	7日	2回	2回	散 布
なす	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類	5,000~10,000	100~300 ℓ/10a	前日	2回	3回(育苗期の株元散布および定植時の土壌混和は合計1回、散布および常温燻蒸は合計2回)	散 布
ピーマン (施設栽培)	アブラムシ類 アザミウマ類	5,000~10,000	100~300 ℓ/10a	前日	2回	3回(育苗期の株元散布および定植時の土壌混和は合計1回、散布および常温燻蒸は合計2回)	散 布
とうがらし類	アブラムシ類 アザミウマ類	5,000~10,000	100~300 ℓ/10a	前日*2	2回	3回(育苗期の株元散布および定植時の土壌混和は合計1回、散布および常温燻蒸は合計2回)	散 布
トマト ミニトマト	アブラムシ類 コナジラミ類	5,000~10,000	100~300 ℓ/10a	前日	2回	3回(育苗期の株元散布および定植時の土壌混和は合計1回、散布および常温燻蒸は合計2回)	散 布
きゅうり (施設栽培)	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類	5,000~10,000	100~300 ℓ/10a	前日	2回	3回(育苗期の株元散布および定植時の土壌混和は合計1回、散布および常温燻蒸は合計2回)	散 布
すいか	アブラムシ類 アザミウマ類	5,000~10,000	100~300 ℓ/10a	3日 *3	3回	4回(定植時の土壌混和は1回、散布は3回)	散 布
メロン	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類	5,000~10,000	100~300 ℓ/10a	3日 *3	3回	4回(育苗期の株元散布および定植時の土壌混和は合計1回、散布は3回)	散 布
かぼちゃ	アブラムシ類	10,000	100~300 ℓ/10a	前日 *3	2回	3回(定植時の土壌混和は1回、散布は2回)	散 布
にがうり (施設栽培)	アザミウマ類	10,000	100~300 ℓ/10a	前日	2回	2回(定植時の土壌混和は1回)	散 布

*1 ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く *2 ただし、露地栽培については開花期終了後
*3 ただし、露地栽培については着果後
*印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と、本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

2021年10月現在の登録内容

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期*	使用回数*		使用方法				
					本剤	イミダクロプリド					
はくさい キャベツ	アブラムシ類	10,000	100~300 ℓ/10a	7日	2回	3回(定植時までの処理は1回、定植後の処理は2回)	散 布				
レタス				3日							
ほうれんそう				前日							
なばな類				7日							
みつば				7日、ただし 伏せ込み栽培は伏せ込み前まで							
ねぎ	アザミウマ類	5,000	セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパーポット1 冊(30×60cm、 使用土壌約1.5 ~4ℓ)当り0.5ℓ	14日	1回	3回(定植時までの処理は1回、散布は2回)	灌 注				
	ネギハモグリバエ	500									
たまねぎ	アザミウマ類	5,000~10,000	セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパーポット1 冊(30×60cm、 使用土壌約1.5 ~4ℓ)当り0.5ℓ	定植前日 ~定植時	2回	2回(定植時までの処理は1回)	散 布				
みょうが (花穂)	カイガラムシ類	10,000	100~300 ℓ/10a	前日	2回	2回	散 布				
				みょうが (莖葉)				前日			
すいげんじな	アブラムシ類	10,000	100~300 ℓ/10a	7日	2回	3回(は種時の土壌混和は1回、散布は2回)	散 布				
かぶ	アブラムシ類	10,000	100~300 ℓ/10a	21日	2回	3回(は種時の土壌混和は1回、散布は2回)	散 布				
こんにやく	アブラムシ類	10,000	100~300 ℓ/10a	7日	2回	3回(は種時の土壌混和は1回、散布は2回)	散 布				
さといも (葉柄)	アブラムシ類	80	1.6~2ℓ/10a	前日	3回	3回	無人航空機 による散布				
さといも (葉柄)		200	2~4ℓ/10a								
		400	4~10ℓ/10a								
		10,000	100~300ℓ/10a								
さといも (葉柄)		80	1.6~2ℓ/10a					14日	3回	3回	無人航空機 による散布
		200	2~4ℓ/10a								
		400	4~10ℓ/10a								
さといも (葉柄)		10,000	100~300ℓ/10a					14日	3回	3回	無人航空機 による散布
		80	1.6~2ℓ/10a								
		200	2~4ℓ/10a								
やまのいも	10,000	100~300ℓ/10a	14日	3回	3回	無人航空機 による散布					
	160	3.2~4ℓ/10a									
食用ゆり	アブラムシ類	5,000	100~300 ℓ/10a	前日	3回	3回	散 布				
かんしょ	アブラムシ類	10,000	100~300 ℓ/10a	7日	2回	3回(植付前の土壌混和は1回、散布は2回)	散 布				
にんじん	アブラムシ類	10,000	100~300 ℓ/10a	3日	2回	2回	散 布				
みしまさいこ	アブラムシ類	10,000	100~300 ℓ/10a	30日	3回	3回	散 布				
豆類 (未成熟、ただし、未成熟を らまめを除く)	アブラムシ類	10,000	100~300 ℓ/10a	前日 *2	2回	3回(定植時およびは種時の土壌混和は合計1回、散布は2回)	散 布				
未成熟 そらまめ	アブラムシ類	10,000	100~300 ℓ/10a	7日 *2	3回	3回(定植時およびは種時の土壌混和は合計1回)	散 布				
アスパラガス きく(施設栽培)	アザミウマ類	5,000	100~300 ℓ/10a	前日	2回	2回	散 布				
小麦	アブラムシ類	15,000	60~150ℓ/10a	発生初期	5回	5回	散 布				
ばれいしょ	アブラムシ類 オオニジユウホシテントウ	80	1.6ℓ/10a	14日	2回	3回(植付時の土壌混和は1回、植付後の処理は2回)	無人航空機 による散布				
		160	1.6~3.2ℓ/10a								
		400	3.2~10ℓ/10a								
		2,500	25ℓ/10a								
てんさい	アブラムシ類	300	ペーパーポット1冊 当り(3ℓ/m ²)	21日	2回	3回(種子粉衣は1回、散布は2回)	散 布				
		300~500	5,000~10,000								

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。