

水稲用本田殺菌剤

速く効く! 長く効く! 葉いもちにも穂いもちにも効く!

コラトップ®

豆つぶ®

ピロキロン剤



製剤(実物大)

いもち病防除も
いもちの時代!
いもちの時代!



動力機
散布



手散布




ひしゃく
散布



葉いもち



穂いもち



水に浮いて自己拡散します。



自然に学び自然を守る



特長


- 葉いもち、穂いもちに安定した高い効果が長く持続します。
- 浸透移行性、速効性に優れるため、散布適期が幅広いです。
- 各種薬剤耐性いもち病菌に対して安定した効果を示します。
- 10アール当り250～375グラムと軽量で、拡散性に優れた豆つぶ製剤です。

適用病害名と使用方法

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピロキロンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	250～375g/10a	葉いもちに対しては 初発10日前～初発時 穂いもちに対しては 出穂30日前～5日前まで	2回以内	散布	3回以内 (直播では種時又は 移植時までの処理は 1回以内、 本田では2回以内)
	もみ枯細菌病	375g/10a	出穂30日前～5日前まで			


★上記以外には使用しない。

上手な使い方




試験成績


葉いもちに対する防除効果



穂いもちに対する防除効果①



穂いもちに対する防除効果②



使用上の注意

- 散布に当たっては、湛水状態(水深3～5cm)で均一に散布し、特に、藻類、表層剥離などの水面浮遊物が多い場合は、拡散が不十分になるおそれがあるため、ていねいに散布してください。また、散布後少なくとも4～5日間は湛水状態を保ち、田面を露出させず、散布後7日間は落水およびかけ流しをしないでください。
- 本剤は吸湿性があるので、濡れた手で作業したり、降雨で濡れたりすることがないように注意してください。また、開封後は早めに使用してください。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。

安全使用上の注意

- 誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の処置を受けてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の処置を受けてください。
- 本剤は眼に対して強い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の処置を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は保護メガネ、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗顔・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 保管:密封し、直射日光を避け、冷涼・乾燥した場所に保管してください。

本資料は2019年7月現在の知見に基づき作成しています。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ●防除日誌を記載しましょう。