

各位

全5ページ  
登録速報(2023-180)  
2023年 8月23日  
クミアイ化学工業株式会社  
企画普及部普及課

## 登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。  
適用拡大登録年月日：2023年8月23日

### 記

#### 1 農薬の登録番号及び名称

登録番号：第16225号

名称：クミアイナブ乳剤

#### 2 変更の内容

農薬登録申請書第7項について次のとおり変更し、別紙1のとおりとする。

##### 希釈水量

- 作物名「だいず」の使用時期「雑草生育期イネ科雑草3～5葉期但し収穫30日前まで」及び「雑草生育期イネ科雑草6～8葉期但し収穫30日前まで」の希釈水量を「通常散布50～150L/10a 少量散布25～50L/10a」及び「通常散布50～100L/10a 少量散布25～50L/10a」に変更する。
- 作物名「そば」の使用時期「雑草生育期イネ科雑草3～5葉期但し収穫30日前まで」及び「雑草生育期イネ科雑草6～8葉期但し収穫30日前まで」の希釈水量を「通常散布50～150L/10a 少量散布25～50L/10a」に変更する。

##### 使用時期

- 作物名「はくさい」に使用時期「雑草生育期イネ科雑草6～8葉期但し収穫14日前まで」を追加する。
- 作物名「ブロッコリー」に使用時期「雑草生育期イネ科雑草6～8葉期但し収穫7日前まで」を追加する
- 作物名「ねぎ」に使用時期「雑草生育期イネ科雑草6～8葉期但し収穫30日前まで」を追加する。
- 作物名「アスパラガス」に使用時期「雑草生育期イネ科雑草6～8葉期但し収穫前日まで」を追加する。

##### 作物名

- 作物名「おうぎ」を追加する。

#### 本剤の使用回数及びセットキシジムを含む農薬の総使用回数

- 作物名「みしまさいこ」の本剤の使用回数及びセットキシジムを含む農薬の総使用回数「2回以内」を「4回以内（1年間に2回以内）」に変更する。
- 作物名「しゃくやく（薬用）」の本剤の使用回数及びセットキシジムを含む農薬の総使用回数「2回以内」を「10回以内（1年間に2回以内）」に変更する。

#### 適用雑草名

- 作物名「せり」および「いぐさ」の適用雑草名「水田一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く）」を「一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く）」に変更する。
- 3 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容
- 農薬登録申請書第8項の(5)について以下のとおり変更し、別紙2のとおりとする。

#### 変更前

- (5) てんさいについて、10アール当りの使用液量を25～50Lで散布する場合、少水量散布に適合したノズルを使用すること。

#### 変更後

- (5) そば、だいず及びてんさいについて、10アール当りの使用液量を25～50Lで散布する場合、少水量散布に適合したノズルを使用すること。

変更後の適用表（追加、変更する作物のみ記載）

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	セキゾムを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
<u>だいず</u>	—	一年生 イ科雑草 (ス/メ/カ/ビ/ラ を除く)	<u>雑草生育期</u> <u>イ科雑草 3~5 葉期</u> <u>但し収穫 30 日前まで</u>	150~ 200mL/10a	<u>通常散布</u> <u>50~150L/10a</u> <u>少量散布</u> <u>25~50L/10a</u>	1 回	雑草茎葉 散布又は 全面散布	1 回
			<u>雑草生育期</u> <u>イ科雑草 6~8 葉期</u> <u>但し収穫 30 日前まで</u>	200mL/10a	<u>通常散布</u> <u>50~100L/10a</u> <u>少量散布</u> <u>25~50L/10a</u>			
			雑草生育期 イ科雑草 9~10 葉期 但し収穫 30 日前まで	250~ 300mL/10a	100~ 150L/10a			
<u>雑草生育期</u> <u>イ科雑草 3~5 葉期</u> <u>但し収穫 14 日前まで</u>			150~ 200mL/10a	100~ 150L/10a				
<u>雑草生育期</u> <u>イ科雑草 6~8 葉期</u> <u>但し収穫 14 日前まで</u>			200mL/10a	100L/10a				
雑草生育期 イ科雑草 3~5 葉期 但し収穫 7 日前まで			150~ 200mL/10a	100~ 150L/10a				
<u>雑草生育期</u> <u>イ科雑草 6~8 葉期</u> <u>但し収穫 7 日前まで</u>			200mL/10a	100L/10a				
雑草生育期 イ科雑草 3~5 葉期 但し収穫 30 日前まで			150~ 200mL/10a					
<u>ねぎ</u>					<u>雑草生育期</u> <u>イ科雑草 6~8 葉期</u> <u>但し収穫 30 日前まで</u>			

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	セキジムを含む農薬の総使用回数		
				薬量	希釈水量					
<u>アスパラガス</u>	—	一年生 <u>イネ科雑草</u> ( <u>スメタカビラ</u> を除く)	雑草生育期 <u>イネ科雑草 3~5 葉期</u> 但し収穫前日まで	150~ 200mL/10a	100~ 150L/10a	1 回	雑草茎葉 散布又は 全面散布	1 回		
			<u>雑草生育期</u> <u>イネ科雑草 6~8 葉期</u> 但し収穫前日まで	200mL/10a	100L/10a					
<u>そば</u>			<u>雑草生育期</u> <u>イネ科雑草 3~5 葉期</u> 但し収穫 30 日前まで	150~ 200mL/10a	<u>通常散布</u> 50~150L/10a					
			<u>雑草生育期</u> <u>イネ科雑草 6~8 葉期</u> 但し収穫 30 日前まで	200mL/10a	<u>少量散布</u> 25~50L/10a					
<u>おうぎ</u>			雑草生育期 <u>イネ科雑草 3~6 葉期</u>	150~ 200mL/10a	100L/10a					
<u>みしまさいこ</u>			雑草生育期 <u>イネ科雑草 3~6 葉期</u> 但し収穫 30 日前まで	150~ 200mL/10a	100~ 150L/10a				<u>4 回以内</u> ( <u>1 年間に</u> <u>2 回以内</u> )	<u>4 回以内</u> ( <u>1 年間に</u> <u>2 回以内</u> )
<u>しゃくやく</u> ( <u>薬用</u> )			雑草生育期 <u>イネ科雑草 3~6 葉期</u> 但し収穫 60 日前まで		100L/10a				<u>10 回以内</u> ( <u>1 年間に</u> <u>2 回以内</u> )	<u>10 回以内</u> ( <u>1 年間に</u> <u>2 回以内</u> )
<u>せり</u>			雑草生育期 <u>イネ科雑草 3~5 葉期</u> 但し収穫 60 日前まで	200mL/10a	100~ 150L/10a				2 回以内	雑草茎葉 散布
<u>いぐさ</u>	雑草生育期 <u>イネ科雑草 3~5 葉期</u>	3 回以内	雑草茎葉 散布又は 全面散布			3 回以内				

8. 使用上の注意事項

- (1) 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (2) 雑草茎葉にかかるよう、まきむらのないよう均一に散布すること。
- (3) 広葉雑草およびカヤツリグサ科には効果が期待できないので、イネ科雑草優占圃場で使用すること。なお広葉雑草などが混在する場合は、これらの雑草に有効な除草剤との体系で使用すること。
- (4) 遅効的であり、イネ科雑草を完全に枯殺するまでに 7~10 日を要するので、誤ってまき直しなどしないように注意すること。
- (5) そば、だいず及びてんさいについて、10 アール当りの使用液量を 25~50L で散布する場合、少水量散布に適合したノズルを使用すること。
- (6) 散布器具、容器の洗浄水及び残りの薬液は河川等に流さず、容器は環境に影響を与えないよう適切に処理すること。
- (7) 公園、堤とう等で使用する場合、特に以下のことに注意すること。
  - ① 激しい降雨の予想される場合は使用をさけること。
  - ② 散布薬液の飛散、あるいは本剤の流出によって有用植物に薬害が生じることのないよう十分注意して散布すること。
  - ③ 水源池、養魚池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意すること。
- (8) 本剤は自動車などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意すること。
- (9) 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意すること。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

以上