

各位

全3ページ
登録速報(2024-026)
2023年12月20日
クミアイ化学工業株式会社
企画普及部普及課

登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。
適用拡大登録年月日：2023年12月20日

記

1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号： 第24090号

名称： ベリマークSC (エフエムシー・ケミカルズ(株)登録)

2. 変更の内容

農薬登録申請書第7項中、以下の事項を追加し【変更後】のとおりとする。

- ・作物名「キャベツ」、「はくさい」、「ブロッコリー」、「レタス」、及び「非結球レタス」に、適用病害虫名「シロイチモジヨトウ」を追加する。
- ・作物名「レタス」、及び「非結球レタス」に、適用病害虫名「コオロギ類」を、使用時期「定植当日」にて追加する。
- ・作物名「こまつな」を、適用病害虫名「アオムシ」、「コナガ」、「アブラムシ類」、希釈倍数「4000倍」、使用液量「0.2 L/m²」、使用時期「収穫7日前まで」、使用方法「株元灌注」にて追加し、作物名「非結球あぶらな科葉菜類(こまつなを除く)」を「非結球あぶらな科葉菜類」に変更する。
- ・作物名「ピーマン」の適用病害虫名「アブラムシ類」に、希釈水量「400株当たり200L(1株当たり500mL)」を使用時期「定植直後」及び使用方法「株元灌注」にて追加する。
- ・作物名「ピーマン」のシアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数を「4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)」に変更する。
- ・作物名「なす」、「メロン」及び「すいか」の適用病害虫名「アブラムシ類」に、希釈水量「400株当たり200L(1株当たり500mL)」を使用時期「定植直後」及び使用方法「株元灌注」にて追加する。

【変更後】（変更する作物のみ抜粋）

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	シアントリフ [®] ロー を含む農薬の 総使用回数
<u>キャベツ</u>	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダ [®] ラノメイガ [®] アブラムシ類 アザミウマ類 ネキリムシ類 ウワバ [®] 類 <u>シロイモシヨトウ</u>	400 倍	セル成型育苗ト イ1箱または ペーパーポット1 冊 (約30× 60cm、 使用土壌 約1.5~4L) 当り0.5L	育苗期後半 ~定植当日	1 回	灌注	4 回以内 (定植時までの処 理は1回以内、定 植後の処理は3回 以内)
<u>はくさい</u>	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダ [®] ラノメイガ [®] カブラハ [®] チ類 アブラムシ類 <u>シロイモシヨトウ</u>						4 回以内 (定植時までの処 理は1回以内、定 植後の散布は3回 以内)
<u>ブロッコリー</u>	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダ [®] ラノメイガ [®] アブラムシ類 アザミウマ類 <u>シロイモシヨトウ</u>						4 回以内 (定植時までの処 理は1回以内、定 植後の処理は3回 以内)
<u>レタス</u> <u>非結球レタス</u>	オオタバコガ [®] ハスモンヨトウ ヒメフタテンヨコバ [®] イ ハモク [®] リハ [®] エ類 アブラムシ類 ウワバ [®] 類 <u>シロイモシヨトウ</u> <u>コオロギ[®]類</u>						4 回以内 (定植時までの処 理は1回以内、定 植後の散布は3回 以内)
<u>非結球</u> <u>あぶらな科</u> <u>葉菜類</u>	<u>アオムシ</u> <u>コナガ</u> <u>アブラムシ類</u>	<u>4000 倍</u>	<u>0.2L/m²</u>	<u>収穫7日前</u> <u>まで</u>		<u>株元</u> <u>灌注</u>	1 回

(つづき)

作物名	適用 病害虫名	使用量		使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	シアントリプロロール を含む農薬の 総使用回数	
		薬量	希釈水量					
<u>ピーマン</u>	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	400 株当り 25mL	400 株当り 10～20L (1 株当り 25～50mL)	育苗期後半 ～定植当日	1 回	灌注	<u>4 回以内</u> (<u>定植時まで</u> <u>の処理及び定</u> <u>植直後の株元</u> <u>灌注は合計 1</u> <u>回</u> <u>以内、定植後</u> <u>の散布は 3 回</u> <u>以内)</u>	
	コガネムシ類		400 株当り 10L (1 株当り 25mL)					
	<u>アブラムシ類</u>		<u>400 株当り</u> <u>200L</u> (<u>1 株当り</u> <u>500mL</u>)	<u>定植直後</u>		<u>株元</u> <u>灌注</u>		
<u>なす</u>	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類 ハモグリハエ類 ネキリムシ類		400 株当り 10～20L (1 株当り 25～50mL)	育苗期後半 ～定植当日		灌注		1 回
	<u>アブラムシ類</u>		<u>400 株当り</u> <u>200L</u> (<u>1 株当り</u> <u>500mL</u>)	<u>定植直後</u>		<u>株元</u> <u>灌注</u>		
<u>メロン</u> <u>すいか</u>	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類		400 株当り 10～20L (1 株当り 25～50mL)	育苗期後半 ～定植当日		灌注		1 回
	<u>アブラムシ類</u>	<u>400 株当り</u> <u>200L</u> (<u>1 株当り</u> <u>500mL</u>)	<u>定植直後</u>	<u>株元</u> <u>灌注</u>				

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容
なし

以上