

# ストロビーフロアブル（クレソキシムメチル水和剤）

適用病害と使用方法

2018年1月17日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クレソキシムメチルを含む農薬の総使用回数	
麦類(小麦を除く)	赤かび病 赤さび病 うどんこ病	2000～3000倍	60～150L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内	
小麦	赤かび病	500倍	25L/10a					
はくさい	黒斑病 白斑病 べと病	3000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内		2回以内	
たかな	白斑病			収穫7日前まで				2回以内
のざわな	べと病			収穫14日前まで				3回以内
たいさい	白斑病			収穫7日前まで				2回以内
アサ	白さび病			収穫前日まで				3回以内
なばな				3000～4000倍				2回以内
おおさきな	黒斑病			3000倍				3回以内
かぼちゃ	うどんこ病 べと病	2000～3000倍					3回以内	
きゅうり	うどんこ病 褐斑病 炭疽病 べと病							
すいか	うどんこ病 炭疽病 つる枯病							
にがうり	うどんこ病 べと病	3000倍		収穫7日前まで				
メロン	うどんこ病 つる枯病 べと病	2000～3000倍		収穫前日まで				
ズッキーニ	うどんこ病	3000倍						

# ストロビーフロアブル（クレソキシムメチル水和剤）

適用病害と使用方法

2018年1月17日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クレソキシムメチルを含む農薬の総使用回数
うり類(漬物用)	うどんこ病 炭疽病 つる枯病 べと病	3000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
ピーマン	うどんこ病 黒枯病			収穫前日まで			
なす	うどんこ病 すすかび病						
とうがらし類(ししとうを除く)	うどんこ病	4000倍			2回以内		2回以内
ししとう	うどんこ病 黒枯病						
さやえんどう 実えんどう	さび病	3000倍					
アスパラガス	斑点病	2000倍	100～500L/10a		3回以内		3回以内
いちご	うどんこ病	3000～5000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	2回以内		2回以内
しゅんぎく	炭疽病			収穫3日前まで			
食用ぎく	褐斑病 黒斑病 白さび病			収穫7日前まで	3回以内		3回以内
食用ゆり	葉枯病	2000倍		収穫14日前まで			
たまねぎ	灰色かび病	2000～3000倍					
	灰色腐敗病	2000倍					

# ストロビーフロアブル（クレソキシムメチル水和剤）

適用病害と使用方法

2018年1月17日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クレソキシムメチルを含む農薬の総使用回数		
にら	さび病 白斑葉枯病	3000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内		
にんじん	黒葉枯病	2000～3000倍		収穫7日前まで					
	斑点病	3000倍							
にんにく	さび病	2000倍							
らっきょう	乾腐病	200倍	-	植付前	1回	30分間種球浸漬	1回		
たらのぎ	そうか病	2000倍	100～300L/10a	収穫75日前まで	2回以内	散布	2回以内		
ねぎ	黄斑病 黒斑病 さび病	3000倍		収穫7日前まで	3回以内		3回以内		
わけぎ	灰色かび病			収穫21日前まで	2回以内		2回以内		
きく(葉)	褐斑病 黒斑病 白さび病			収穫7日前まで	2回以内				
すいぜんじな	黒斑病			収穫14日前まで					
食用金魚草	さび病			収穫7日前まで					
やまのいも(むかご)	葉渋病			2000倍					3回以内
葉にんにく	さび病			4000倍	収穫14日前まで		2回以内		
食用トナリ	うどんこ病				収穫3日前まで				
きゅうり(花)	うどんこ病 褐斑病 べと病				3000倍				
食用パンプキン	うどんこ病		4000倍	収穫7日前まで	3回以内				
にら(花茎)	さび病 白斑葉枯病	3000倍	収穫前日まで	3回以内				3回以内	

# ストロビーフロアブル（クレソキシムメチル水和剤）

適用病害と使用方法

2018年1月17日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クレソキシムメチルを含む農薬の総使用回数								
にら(花茎)	さび病 白斑葉枯病	3000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内								
食用西洋たんぽぽ	うどんこ病	3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内			2回以内							
食用かえで(葉)				収穫45日前まで											
しそ科葉菜類(しそを除く) しそ	灰色かび病			収穫7日前まで											
しそ	斑点病			4000倍	100～300L/10a			収穫前日まで	3回以内						
セルリー				3000倍											
チャービル	うどんこ病			2000～3000倍							100～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内	2回以内	
パセリ												収穫14日前まで	1回	1回	
ディル(葉)												収穫3日前まで	2回以内	2回以内	
サラダ菜												褐斑病	3回以内	3回以内	
アスター	さび病					2000～3000倍						100～700L/10a	発病初期	3回以内	
きく	褐斑病 黒斑病 白さび病														
りんどう	褐斑病 黒斑病	2000倍	100～300L/10a			収穫7日前まで	3回以内								
やまのいも	葉渋病	2000～3000倍													
茶	網もち病 もち病	2000倍			200～400L/10a			摘採10日前まで	3回以内						
	新梢枯死症 炭疽病 輪斑病	2000～3000倍													
てんさい	褐斑病	2000倍		100～300L/10a	収穫21日前まで			3回以内							
	葉腐病														