

トレボン乳剤（エトフェンプロックス乳剤）

適用害虫と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数
稲	-	イコ類 ウカ類 イネトノオイムシ ツマクノヨコバイ	1000～2000倍	60～150L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
		ウカ類	300～600倍	25L/10a				
		カメムシ類 イネミスゾウムシ	2000倍	60～150L/10a				
		カメムシ類 イネミスゾウムシ イネトノオイムシ ツマクノヨコバイ	600倍	25L/10a				
		イネミスゾウムシ イネトノオイムシ ツマクノヨコバイ	300倍					
		コブノメイガ	1000倍	60～150L/10a				
麦類	-	アブラムシ類 ヒメトビウカ	2000倍			2回以内	2回以内	
あわ	-	アワノメイガ アワヨトウ	1000倍	100～300L/10a		3回以内	3回以内	
きび	-	アカスジカスミカメ						
とうもろこし	-	アワノメイガ アワヨトウ ツマジロクサヨトウ			収穫7日前まで	4回以内		4回以内
水田作物、畑作物（休耕田）	ヨシ、ギ、ススキ、セイカアワビ、チリ等 の多年生雑草が優占している 休耕田	カメムシ類	2000倍	60～150L/10a	-	3回以内		3回以内

適用拡大登録月日：2024年04月24日

トレボン乳剤（エトフェンプロックス乳剤）

適用害虫と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数
水田作物、畑作物（休耕田）	ヨシ、オギ、ススキ、セイタカワグサ等の多年生雑草が優占している休耕田	カメシ類	2000倍	60～150L/10a	-	3回以内	散布	3回以内
かんしょ	-	アブラムシ類 ナガシロシタバ ハスモンヨトウ	1000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
さといも		ハスモンヨトウ			収穫14日前まで			
ばれいしょ		アブラムシ類			収穫7日前まで			
やまのいも		アブラムシ類 ヤマノイモカガ ハスモンヨトウ			収穫14日前まで			
みずいも	水田	オキナワイナゴモトギ		100～150L/10a				
しょうが 葉しょうが	-	ハスモンヨトウ		100～300L/10a	収穫7日前まで			
だいこん		アブラムシ類 コナガ ヨトウムシ アオムシ	1000～2000倍		収穫21日前まで			

適用拡大登録月日：2024年04月24日

トレボン乳剤（エトフェンプロックス乳剤）

適用害虫と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数
てんさい	-	ヨトウムシ	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
ねぎ		シロイチモジ ヨトウ	1000倍		収穫21日前まで	2回以内		2回以内
豆類(種実、ただし、だいず、あずきを除く)		アブラムシ類 カメムシ類 フタスジヒメハムシ シロイチモジ マダラメイガ アズキノメイガ マメシクイガ ウラナミシジミ ハスモンヨトウ ダイズサヤタマハエ			収穫14日前まで			
		あずき	アブラムシ類 カメムシ類 フタスジヒメハムシ ノメイガ類 シロイチモジ マダラメイガ マメシクイガ ウラナミシジミ ハスモンヨトウ ダイズサヤタマハエ					
だいず		アブラムシ類 カメムシ類 フタスジヒメハムシ ノメイガ類 シロイチモジ マダラメイガ マメシクイガ ウラナミシジミ ハスモンヨトウ ダイズサヤタマハエ						


適用拡大登録月日：2024年04月24日

トレボン乳剤（エトフェンプロックス乳剤）

適用害虫と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数
だいず	-	アブラムシ類 ツメクサガ カメムシ類 フタスジヒメハムシ シロイチモジ マダラメイガ ウコンノメイガ アズキノメイガ マメシンクイガ ウラナミシジミ ハスモンヨトウ ダイズサヤマバエ	1000倍	100～300L/ 10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
えだまめ		ツメクサガ カメムシ類 フタスジヒメハムシ シロイチモジ マダラメイガ ウコンノメイガ マメシンクイガ ダイズサヤマバエ						
		ハスモンヨトウ	1000～2000倍					
さやいんげん		ワタアブラムシ マメノメイガ ウラナミシジミ	1000倍					
さやえんどう 実えんどう		ウラナミシジミ ヨトウムシ シロイチモジヨトウ						

 適用拡大登録月日：2024年04月24日

トレボン乳剤（エトフェンプロックス乳剤）

適用害虫と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	
さやえんどう 実えんどう	-	ウナミツヅミ ヨトウムシ シロイモジヨトウ	1000倍	100～300L/ 10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	
未成熟ささげ		アブラムシ類							3回以内
きゅうり		アブラムシ類 コナジラミ類							
にがうり		アブラムシ類 カメムシ類 コナジラミ類 ウリノメイガ ヨトウムシ類							
かぼちゃ		コナジラミ類 ウリハムシ							
すいか		アブラムシ類 コナジラミ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ				収穫3日前まで			
メロン		アブラムシ類 コナジラミ類				4回以内		4回以内	
トマト		コナジラミ類				収穫前日まで		2回以内	2回以内
なす		アブラムシ類				1000～2000倍		3回以内	3回以内
		コナジラミ類				1000倍			
ピーマン		アブラムシ類							
ブロッコリー		アオムシ				1000～2000倍			
モロヘイヤ		アザミウマ類				1000倍		収穫14日前まで	1回

適用拡大登録月日：2024年04月24日

トレボン乳剤（エトフェンプロックス乳剤）

適用害虫と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数		
キャベツ	-	アブラムシ類 コナガ ヨトウムシ アオムシ	1000～2000倍	100～300L/ 10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内		
はくさい					収穫7日前まで					
あしたば					収穫14日前まで					
せり	水田	アブラムシ類	2000倍	100～150L/ 10a	収穫30日前まで	2回以内	2回以内			
せり(水耕栽培)	ガラス室等の施設									
みつば	-				100～300L/ 10a			収穫21日前まで(但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで)		
レタ								収穫14日前まで		
うど								根株養成期(但し、収穫45日前まで)		
さといも(葉柄)								ハスモンヨトウ	収穫7日前まで	
ふき								コナガ類 フキノメイガ ヨトウムシ	収穫14日前まで	
食用ぎく								アブラムシ類	2000倍	収穫3日前まで
okra								アブラムシ類 カメムシ類	1000倍	収穫前日まで

適用拡大登録月日：2024年04月24日

トレボン乳剤（エトフェンプロックス乳剤）

適用害虫と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数
okra	-	アブラムシ類 カメムシ類	1000倍	100～300L/ 10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
じゅんさい	じゅんさい田	ジュンサイハムシ マダラミスメイガ		100～150L/ 10a		2回以内		2回以内
ほうきぎ	-	ホウキギツツミノガ		100～300L/ 10a	収穫30日前まで			
やまのいも(むかご)		アブラムシ類 ヤマノイモコガ ハスモンヨトウ			収穫14日前まで	3回以内		3回以内
おうぎ		ウリハムシトビキ			収穫45日前まで	4回以内(但し、1年間に2回以内)		4回以内(但し、1年間に2回以内)
せんきゅう					収穫14日前まで	3回以内		3回以内
とうき		キアゲハ			幼虫発生期	6回以内		6回以内
採種用とうき						12回以内(但し、1年間に6回以内)		12回以内(但し、1年間に6回以内)
かんきつ		ケシスイ類 コアオハナムグリ		200～700L/ 10a	収穫前日まで	3回以内		3回以内
		チャノキイロアザミウマ	2000倍					
		ミカンハモグリガ	1000～2000倍					
マンゴ-		チャノキイロアザミウマ	1000倍		収穫7日前まで			
カーネーションきく		アブラムシ類	2000倍	100～300L/ 10a	発生初期	6回以内		6回以内

適用拡大登録月日：2024年04月24日

トレボン乳剤（エトフェンプロックス乳剤）

適用害虫と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数
宿根かすみそう	-	ヨトウムシ	2000倍	100～300L/ 10a	-	6回以内	散布	6回以内
		シロイモジヨトウ	1000倍					
トルコギキョウ		ハスモンヨトウ						
ゆり		アブラムシ類	2000倍					
りんどう		ヒラスハナアザミウマ		100～700L/ 10a	幼虫発生期			
樹木類(つつじ類、ホ °インセチア、ソテツを除く)		オビカレハ						
		シャクトリムシ類 ケムシ類	4000倍					
ホ°インセチア		オビカレハ	2000倍					
		コナジラミ類	1000倍		-			
		シャクトリムシ類 ケムシ類	4000倍		幼虫発生期			
ソテツ		オビカレハ	2000倍					
		シャクトリムシ類 ケムシ類	4000倍					
		クロマダラソテツジミ	2000～4000倍					
つつじ類		オビカレハ	2000倍					
	シャクトリムシ類 ケムシ類	4000倍						
	ツツジケンバイ	2000倍		-				
飼料用とうもろこ し(子実)		アワノメイガ アワヨトウ ツマシロクサヨトウ	1000倍	100～300L/ 10a	収穫7日前まで	4回以内		4回以内


適用拡大登録月日：2024年04月24日

トレボン乳剤（エトフェンプロックス乳剤）

適用害虫と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数
飼料用とうもろこし(子実)	-	アノメイガ アヲヨトウ ツマジロクサヨトウ	1000倍	100～300L/ 10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内
茶		チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメコバイ チャノホリガ	2000倍	200～400L/ 10a	摘採21日前まで	2回以内		2回以内
たばこ		アブラムシ類 タバコノミハムシ	1000～2000倍	25～180L/ 10a	収穫10日前まで			
	タバコガ ヨトウムシ	2000倍						

 適用拡大登録月日：2024年04月24日