

# クサカリテイオーLフロアブル（ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキサゾン水和剤）

適用雑草と使用方法

2009年9月15日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカ トゲカ クダマ コウキガラ(関東・東山・東海、九州) セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ アオイトロ・藻類による表層はく離(北陸、九州)	移植直後～ルビ1.5葉期(但し、移植後30日まで)	砂壤土～埴土	500ml/10a	1回	原液湛水散布	全域(北海道、東北を除く)の普通期及び早期栽培地帯	2回以内	2回以内	2回以内
		移植時				田植同時散布機で施用				

# クサカリテイオーLフロアブル（ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキサゾン水和剤）

適用雑草と使用方法

2009年9月15日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻		移植時	砂壤土～埴土	500ml/10a	1回	田植同時散布機で施用	全域（北海道、東北を除く）の普通期及び早期栽培地帯	2回以内	2回以内	2回以内