

グラスショット液剤（ビスピリバックナトリウム塩液剤）

適用雑草と使用方法

2014年4月23日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	ビスピリバックナトリウム塩を含む農薬の総使用回数
水田作物(水田畦畔)	水田畦畔	休 ^レ クサ	生育期(但し、収穫前日まで)	300~500ml/10a	50~100L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
林木	林地	クサ	生育初期(5月~6月)	つる径: 使用量(ml/株) 2.0cm以下: 0.5、2.1~3.0cm: 1.0、3.1~4.0cm: 1.5、4.1~5.0cm: 2.0、5.1cm以上: 適宜増量	原液		つる注入処理	
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、運動場、宅地等		生育期	500~1000ml/10a	100~200L/10a		植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	

グラスショット液剤（ビスピリバックナトリウム塩液剤）

2014年4月23日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用目的	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	ビスピリバックナトリウム塩を含む農薬の総使用回数
水田作物(水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草 多年生雑草	草丈抑制による刈り取り軽減	雑草生育初期(草丈10cm)及び草刈り後10~20日の雑草再生期(但し、収穫前日まで)	300~500ml/10a	通常散布50~100L/10a、少量散布25L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、運動場、宅地等			雑草生育期又は刈取後(草丈30~50cm)	500~1000ml/10a	通常散布100~200L/10a、少量散布25~50L/10a		植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	