

エムダイファー水和剤（マンネブ水和剤）

適用病害虫と使用方法

2019年10月9日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンネブを含む農薬の総使用回数
せんきゅう	べと病	600倍	100～300L/10a	収穫21日前まで	4回以内	散布	4回以内
とうき			100L/10a	収穫14日前まで			
かんきつ(みかんを除く)	黒点病 小黒点病	600～800倍	200～700L/10a	収穫90日前まで	2回以内		2回以内
	ミカンビダニ	1000倍					
みかん	黒点病 小黒点病	600～800倍		収穫60日前まで			
	ミカンビダニ	1000倍					
なし	赤星病	400～650倍	収穫45日前まで	3回以内		3回以内	
りんご	黒点病		収穫30日前まで	1回		1回	
かき	炭疽病 落葉病		収穫45日前まで	2回以内		2回以内	
カーネーション きく	さび病 炭疽病 灰色かび病 べと病		100～300L/10a	発病初期	8回以内		8回以内
チューリップ°	褐色斑点病	500倍					
ばら	さび病 炭疽病 灰色かび病 べと病	400～650倍					
すぎ	赤枯病	400～600倍	300L/10a	床替活着後			
ばれいしょ	疫病	400～650倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	7回以内		7回以内