

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2025年4月23日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
かんしょ	白絹病 つる割病 紫紋羽病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a	植付21日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	1回
	基腐病	30kg/10a				
こんにゃく	乾腐病 白絹病	20～30kg/10a				
	根腐病 一年生雑草	20～60kg/10a				
さといも	乾腐病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a				
ばれいしょ	萎凋病 黒あざ病 そうか病 粉状そうか病 一年生雑草					
やまのいも	褐色腐敗病 根腐病 一年生雑草					
かぶ	萎黄病 根こぶ病 バネツリウム黒点病 一年生雑草					
ごぼう	萎凋病 黒あざ病 一年生雑草	は種28日前まで				
しょうが	根茎腐敗病	30～60kg/10a	定植21日前まで			
	一年生雑草	20～30kg/10a				

適用拡大登録月日：2025年04月23日

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2025年4月23日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
葉しょうが	根茎腐敗病	30kg/10a	定植21日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	1回
	一年生雑草	20～30kg/10a				
だいこん	萎黄病 根こぶ病 バクテリア黒点病 一年生雑草	10～20kg/10a	は種21日前まで			
	ネグサセンチュウ					
てんさい	叢根病 苗立枯病	200～400g/立方メートル	秋期(翌春は種)			
にんじん	萎凋病 乾腐病 白絹病 根腐病 しみ腐病 ネグサセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植21日前まで			
はつかだいこん	一年生雑草	20kg/10a	は種35日前まで			
もりあざみ	黒あざ病 半身萎凋病 一年生雑草	30kg/10a	は種21日前まで			
たまねぎ	乾腐病 白絹病 ネグサセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植21日前まで			
	黒腐菌核病	30～60kg/10a				

適用拡大登録月日：2025年04月23日

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2025年4月23日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
たまねぎ	黒穂病 一年生雑草	20～30kg/10a	秋期(翌春は種)	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	1回
	紅色根腐病 苗立枯病	30kg/10a 20～40kg/10a	は種又は定植21日前まで			
	べと病	20kg/10a	は種14日前まで		本剤の所定量を均一に散布して浅く混和する。	
	たまねぎ 葉たまねぎ(苗床)	一年生雑草	10～20kg/10a			
にんにく	黒腐菌核病 紅色根腐病 白絹病 イモガサセンチュウ 一年生雑草	30kg/10a	植付28日前まで		本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	
			らっきょう			
にら	乾腐病 黒腐菌核病 紅色根腐病 白絹病		は種又は定植21日前まで			

適用拡大登録月日：2025年04月23日

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2025年4月23日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
にら	一年生雑草	30～60kg/10a	は種又は定植21日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	1回
ねぎ	萎凋病 白絹病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 根腐萎凋病 小菌核腐敗病 ネコアセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植14日前まで	1回		
	黒腐菌核病	30～60kg/10a				
	紅色根腐病 ネギハダクダマ	30kg/10a				
わけぎ	黒腐菌核病	20～30kg/10a	は種又は定植21日前まで	1回		
	苗立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草					
らっかせい	白絹病 一年生雑草	30kg/10a	は種21日前まで	1回		
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、実えんどう、さやえんどう、さやいんげん、未成熟そらまめを除く)	茎腐病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草					
えだまめ	白絹病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 葉腐病 一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植21日前まで	1回		


適用拡大登録月日：2025年04月23日

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2025年4月23日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
えだまめ	白絹病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 葉腐病 一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植21日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	1回
	ダズメットセンチュウ	30kg/10a				
さやいんげん	白絹病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 葉腐病 一年生雑草	20～30kg/10a	は種21日前まで			
さやえんどう 実えんどう	茎腐病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草		は種又は定植21日前まで			
未成熟そらまめ	茎腐病 苗立枯病(リゾクトニア菌) えそメザイク病 一年生雑草	30kg/10a	は種21日前又は定植45日前まで			
きゅうり	白絹病 つる割病 半身萎凋病 一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植21日前まで		土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。	
	苗立枯病(リゾクトニア菌) 苗立枯病(ピシウム菌)	200～400g/立方メートル				
にがうり	つる割病 ネコアセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a			本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	


 適用拡大登録月日：2025年04月23日

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2025年4月23日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
かぼちゃ	苗立枯病(リゾクトニア菌) フザリウム立枯病 一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植21日 前まで	1回	本剤の所定量を均 一に散布して土壌 と混和する	1回
	すいか	白絹病 つる割病 一年生雑草				
メロン	紅色根腐病	30kg/10a			土壌に本剤の所定量 を加え十分混和する。	
	黒点根腐病 白絹病 つる割病 半身萎凋病 黒変根腐症 一年生雑草	20～30kg/10a			本剤の所定量を均 一に散布して土壌 と混和する	
	苗立枯病(リゾクトニア菌)	200～400g/立方 メートル			土壌に本剤の所定量 を加え十分混和する。	
トマト	青枯病	30～60kg/10a			本剤の所定量を均 一に散布して土壌 と混和する	
	萎凋病 褐色根腐病 白絹病 根腐萎凋病 半身萎凋病 ネコノヒゲ 一年生雑草	20～30kg/10a				


 適用拡大登録月日：2025年04月23日

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2025年4月23日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
トマト	萎凋病 褐色根腐病 白絹病 根腐萎凋病 半身萎凋病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植21日 前まで	1回	本剤の所定量を均 一に散布して土壌 と混和する	1回
	紅色根腐病	30kg/10a				
	苗立枯病(リゾクトニア菌)	200～300g/立方 メートル				
ミニトマト	青枯病	30～60kg/10a			本剤の所定量を均 一に散布して土壌 と混和する	
	萎凋病 褐色根腐病 白絹病 根腐萎凋病 半身萎凋病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a				
	紅色根腐病	30kg/10a				
	苗立枯病(リゾクトニア菌)	200～300g/立方 メートル				
なす	青枯病	30kg/10a			本剤の所定量を均 一に散布して土壌 と混和する	
	白絹病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 半身萎凋病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a				

 適用拡大登録月日：2025年04月23日

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2025年4月23日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
ピーマン	青枯病 萎凋病 白絹病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 半身萎凋病 一年生雑草	30kg/10a	は種又は定植21日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	1回
とうがらし類	青枯病 萎凋病 疫病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草		定植21日前まで			
カリフラワー	根こぶ病 一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植21日前まで			
	テンサイストセンチュウ	30kg/10a				
ブロッコリー	根こぶ病 一年生雑草	20～30kg/10a				
	テンサイストセンチュウ	30kg/10a				
つるむらさき	ネコセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a	定植21日前まで			
モロヘイヤ		30kg/10a	定植30日前まで			
非結球あぶらな科葉菜類(非結球メキャベツ、こまつな、非結球はくさい、なばな類、チンゲンサイ、みずなを除く)	根こぶ病		は種14日前まで			

適用拡大登録月日：2025年04月23日

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2025年4月23日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
非結球あぶらな科葉菜類 (非結球キャベツ、こまつな、非結球はくさい、なばな類、チゲンサイ、みずなを除く)	根こぶ病	30kg/10a	は種14日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	1回
	一年生雑草	20～30kg/10a				
こまつな	萎黄病 根こぶ病 一年生雑草		は種10日前まで			
チゲンサイ	根こぶ病 一年生雑草	30kg/10a	は種又は定植21日前まで			
非結球キャベツ	萎黄病 一年生雑草	20～30kg/10a	定植21日前まで			
みずな	立枯病(ピシウム菌) 根こぶ病 一年生雑草	30kg/10a	は種12日前まで			
なばな類	根こぶ病 一年生雑草	20kg/10a	は種又は定植21日前まで			
非結球はくさい	萎黄病 根こぶ病 一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植14日前まで			
キャベツ	萎黄病 株腐病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 根こぶ病 バーティリウム萎凋病 ネコブセンチュウ 一年生雑草		は種又は定植21日前まで			

適用拡大登録月日：2025年04月23日

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2025年4月23日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
キャベツ	萎黄病 株腐病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 根こぶ病 パーテイリウム萎凋病 ネコアセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植21日 前まで	1回	本剤の所定量を均 一に散布して土壌 と混和する	1回
はくさい	黄化病 根くびれ病 根こぶ病 尻腐病 ネコアセンチュウ 一年生雑草					
あしたば	苗立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草	30kg/10a	は種10日前まで	1回	本剤の所定量を均 一に散布して土壌 と混和する	1回
セルリー	萎黄病 一年生雑草		は種又は定植21日 前まで			
チャービル	一年生雑草	20kg/10a	は種42日前まで	1回	本剤の所定量を均 一に散布して土壌 と混和する	1回
パセリ	萎凋病 疫病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草	30kg/10a	は種又は定植21日 前まで	1回	本剤の所定量を均 一に散布して土壌 と混和する	1回
みつば	立枯病 一年生雑草	20kg/10a	は種21日前まで	1回	本剤の所定量を均 一に散布して土壌 と混和する	1回
レタス	黒根病 コルキールト病 ネコアセンチュウ	30kg/10a	は種又は定植14日 前まで	1回	本剤の所定量を均 一に散布して土壌 と混和する	1回
	白絹病 すそ枯病 一年生雑草	20～30kg/10a				
非結球レタス	黒根病 コルキールト病	30kg/10a	は種又は定植14日 前まで	1回	本剤の所定量を均 一に散布して土壌 と混和する	1回

適用拡大登録月日：2025年04月23日

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2025年4月23日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
非結球レタス	黒根病 コルキールト病	30kg/10a	は種又は定植14日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	1回
	白絹病 すそ枯病 根腐病 一年生雑草	20～30kg/10a				
しゅんぎく	萎凋病 一年生雑草	20kg/10a	は種21日前まで			
葉ごぼう	萎凋病 黒あざ病 一年生雑草	20～30kg/10a	は種28日前まで			
しそ	青枯病 一年生雑草	30kg/10a	は種又は定植14日前まで			
ほうれんそう	萎凋病 株腐病 立枯病 根腐病 ホウレンソウケナガコナダニ 一年生雑草	20～30kg/10a	は種10日前まで		本剤の所定量を均一に散布して浅く混和する。	
	ホウレンソウケナガコナダニ	10kg/10a				
さといも(葉柄)	乾腐病 ホウレンソウケナガコナダニ 一年生雑草	20～30kg/10a	植付21日前まで		本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	
ふき	白絹病 半身萎凋病 一年生雑草	30kg/10a	は種又は定植21日前まで			


適用拡大登録月日：2025年04月23日

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2025年4月23日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
ふき	白絹病 半身萎凋病 一年生雑草	30kg/10a	は種又は定植21日 前まで	1回	本剤の所定量を均 一に散布して土壌 と混和する	1回
食用ぎく	青枯病	20～30kg/10a				
	萎凋病 白絹病 半身萎凋病 センチュウ類(ハカレセンチュウを除く) 一年生雑草					
いちご	青枯病 疫病	30kg/10a	仮植又は定植21日 前まで			
	萎黄病 萎凋病 炭疽病 芽枯病 一年生雑草	20～30kg/10a				
やまのいも(むかご)	褐色腐敗病 根腐病 一年生雑草		植付21日前まで			
みょうが(花穂) みょうが(茎葉)	立枯症 一年生雑草	30kg/10a	定植42日前まで			
しゃくやく(薬用)	白絹病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a	植付前			
	根黒斑病	30～40kg/10a				
セネガ	一年生雑草	30kg/10a	は種又は定植前			
薬用ごぼう	萎凋病 黒あざ病 一年生雑草	20～30kg/10a				

 適用拡大登録月日：2025年04月23日

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2025年4月23日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
なし	白紋羽病	100g/平方メートル	夏期～秋期	1回	被害株跡地に本剤の所定量を均一に散布して土壌と十分混和する。	1回
りんご	白紋羽病 紫紋羽病	50～100g/平方メートル	は種又は植付前			
ぶどう	白紋羽病					
花き類・観葉植物	青枯病	30kg/10a		は種又は植付前	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	
	萎黄病 萎凋病 株腐病 球根腐敗病 首腐病 根頭がんしゅ病 白絹病 立枯病 苗立枯病(リゾクシア菌) 半身萎凋病 ネコフセンチュウ	20～30kg/10a				
	一年生雑草	20～60kg/10a				
アイスランドホップ	萎縮病	20～30kg/10a				
カーネーション	萎凋細菌病					

適用拡大登録月日：2025年04月23日

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2025年4月23日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
きく	センチュウ類(ハダレセンチュウを除く)	20～30kg/10a	は種又は植付前	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	1回
ゲリサ	紅色根腐病					
さくらそう	軟腐病					
しゃくやく	根黒斑病	30～40kg/10a	植付前			
スイピー	腰折病	20～30kg/10a	は種又は植付前			
スターチス	萎凋細菌病					
ストック	萎凋病	30～40kg/10a				
	苗腐病	20～30kg/10a				
トルコキキョウ パッション	根腐病					
ぼたん	根黒斑病	30～40kg/10a	植付前			
樹木類(苗木)	一年生雑草	20～30kg/10a				
せんりょう	立枯病 一年生雑草		は種又は植付前			
つつじ類	センチュウ類 一年生雑草					
芝	一年生雑草	30kg/10a	は種又は定植21日前まで			
		目土用土1立方メートル当たり100～200g	雑草発生前		土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。	

適用拡大登録月日：2025年04月23日

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2025年4月23日現在


作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
いぐさ	一年生雑草	30kg/10a	畑苗床での定植28日前まで(入水15日前まで)	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	1回
桑	白紋羽病 紫紋羽病	1株当り(4平方メートル)400～600g	夏期～秋期		被害株跡地に本剤の所定量を均一に散布して土壌と十分混和する。	
たばこ	疫病 黒根病 立枯病 一年生雑草	20～30kg/10a	秋期(翌春植付)		本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	
	疫病 センチュウ類	5～10kg/10a	春期(植付前)		本剤の所定量を畦面に散布して土壌と十分混和する。	
	角斑病 野火病 センチュウ類	10～20kg/10a	秋期(翌春植付)	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する		

 適用拡大登録月日：2025年04月23日

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

2025年4月23日現在

作物名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数	使用目的
樹木類	100g/平方メートル	定植前	1回	被害株跡地に本剤の所定量を均一に散布して土壌と十分混和する。	1回	定植ほ場の南根腐病菌、ならたけ病菌、ならたけもどき病菌の密度低減

 適用拡大登録月日：2025年04月23日