

カーゼートPZ水和剤（シモキサニル・マンゼブ水和剤）

適用病害と使用方法

2012年11月7日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シモキサニルを含む農薬の総使用回数	マンゼブを含む農薬の総使用回数
はくさい	べと病	1000～1500倍	100～400L/ 10a	収穫30日前まで	1回	散布	3回以内	1回
きゅうり			150～300L/ 10a	収穫前日まで	3回以内			3回以内
すいか	褐色腐敗病	1000倍		収穫7日前まで				7回以内
	つる枯病							5回以内
メロン	べと病	1000～1500倍						2回以内
トマト	疫病			収穫前日まで	2回以内			2回以内
たまねぎ	白色疫病 べと病	1000倍	100～300L/ 10a	収穫3日前まで	3回以内			5回以内
らっきょう	白色疫病	600～800倍	100～200L/ 10a	収穫30日前まで				3回以内
ぶどう	べと病	1000～1500倍	200～700L/ 10a	収穫45日前まで	2回以内			2回以内
だいず		1000倍	100～300L/ 10a		3回以内			3回以内
ばれいしょ	疫病	600～800倍	10a	収穫7日前まで	4回以内	4回以内	10回以内（但し、無人ヘリ散布は3回以内）	