

# ストロビードライフロアブル（クレソキシムメチル水和剤）

適用害虫と使用方法

2011年11月30日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クレソキシムメチルを含む農薬の総使用回数
かき(葉)	うどんこ病 炭疽病 灰色かび病 落葉病	3000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
かんきつ	黄斑病 褐色腐敗病	2000倍					
なし	黒点病 そうか病 そばかす病 灰色かび病	2000～3000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	うどんこ病 黒斑病 輪紋病						
	黒星病	3000倍					
りんご	炭疽病	2000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	赤星病 斑点落葉病	1500～3000倍					
	うどんこ病 黒星病 黒点病 モニア病	3000倍					
もも ネクタリン	褐斑病 すす点病 すす斑病 炭疽病 輪紋病	2000～3000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	うどんこ病 黒星病 黒斑病 縮葉病（休眠期） 灰星病	2000倍					

# ストロビードライフロアブル（クレソキシムメチル水和剤）

適用害虫と使用方法

2011年11月30日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クレソキシムメチルを含む農薬の総使用回数
もも 初刈り	うどんこ病 黒星病 黒斑病 縮葉病（休眠期） 灰星病	2000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
小粒核果類（うめ、すももを除く）	環紋葉枯病			収穫7日前まで			
うめ	うどんこ病 灰色かび病 環紋葉枯病						
	黒星病 すす斑病	2000～3000倍					
すもも	炭疽病 環紋葉枯病	2000倍					
ぶどう	うどんこ病 さび病	3000倍	2000～3000倍	収穫14日前まで			
	晩腐病 褐斑病 黒とう病 枝膨病 灰色かび病 べと病						
ブルーベリー	灰色かび病 斑点病	3000倍			2回以内		2回以内
マンゴー	炭疽病	2000倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内

# ストロビードライフロアブル（クレソキシムメチル水和剤）

適用害虫と使用方法

2011年11月30日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クレソキシムメチルを含む農薬の総使用回数
あけび(果実)	うどんこ病	3000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
さんしょう(果実)	さび病	2000倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内
バナ	黒星病	3000倍		収穫21日前まで	3回以内		3回以内
かき	うどんこ病 炭疽病 灰色かび病 落葉病			収穫14日前まで			
キウイフルーツ	すす斑病 貯蔵病害（灰色かび病）	2000倍		収穫前日まで			
	灰色かび病	2000～3000倍					
ぼけ	赤星病 褐斑病	3000倍		発病初期			
じんちょうげ	黒点病						
やなぎ	葉さび病						
ホヱラ	マルヱナ落葉病						
せいようきんしばい	さび病						