

ブロードワン顆粒水和剤（チオファネートメチル・メパニピリム水和剤）

適用病害と使用方法

2017年2月23日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数	メパニピリムを含む農薬の総使用回数
きゅうり トマト ミニトマト なす	菌核病 灰色かび病	1500倍	100～300L/ 10a	収穫前日まで	4回以内	散布	6回以内（但し、種子への処理は1回以内、は種後は5回以内）	4回以内
				収穫7日前まで	2回以内			
レタス							4回以内（但し、種子への処理は1回以内、灌注は1回以内、散布は2回以内）	2回以内
あずき	菌核病	800～1000倍	-	収穫14日前まで	4回以内		5回以内（但し、種子への処理は1回以内、は種後は4回以内）	5回以内
	炭疽病 灰色かび病	1000倍						
いんげんまめ	菌核病 炭疽病 灰色かび病							

ブロードワン顆粒水和剤（チオファネートメチル・メパニピリム水和剤）

適用病害と使用方法

2017年2月23日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数	メパニピリムを含む農薬の総使用回数
いんげんまめ	菌核病 炭疽病 灰色かび病	1000倍	-	収穫14日前まで	4回以内	散布	5回以内（但し、種子への処理は1回以内、は種後は4回以内）	5回以内