

プロポーズ顆粒水和剤（ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN水和剤）

適用病害と使用方法

2024年10月30日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチアバリカルブイソプロピルを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数	
ばれいしょ	疫病 夏疫病	750～1000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内	5回以内	
		250倍	25L/10a						
		32倍	3.2L/10a			無人航空機による散布			
		16倍	1.6L/10a						
たまねぎ	灰色かび病 白色疫病 べと病	1000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内	6回以内	
らっきょう	白色疫病								3回以内
ねぎ	葉枯病 べと病								16倍
		べと病	32倍	3.2L/10a					
	だいず	茎疫病 紫斑病 べと病	1000倍	100～300L/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内	
きゅうり	うどんこ病 褐斑病 黒星病	収穫前日まで							3回以内

適用拡大登録月日：2024年10月30日

プロポーズ顆粒水和剤（ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN水和剤）

適用病害と使用方法

2024年10月30日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチアバリカルブイソプロピルを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
きゅうり	うどんこ病 褐斑病 黒星病	1000倍	100～300L/ 10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	14回以内（ 但し、土壌 灌注は2回 以内、散布、 常温煙霧、 くん煙及び Iアゾル剤の 噴射は合計 12回以内）
	べと病	1000～1500倍						
かぼちゃ	うどんこ病 疫病 べと病	1000倍		収穫7日前まで	5回以内		5回以内	3回以内
すいか	褐色腐敗病 炭疽病			収穫3日前まで				5回以内
メロン	つる枯病 べと病							
トマト	疫病	1000～1500倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内	6回以内（但し、土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びIアゾル剤の噴射は合計4回以内）

適用拡大登録月日：2024年10月30日

プロポーズ顆粒水和剤（ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN水和剤）

適用病害と使用方法

2024年10月30日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチアバリカルブイソプロピルを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数		
トマト	疫病	1000～1500倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	6回以内(但し、土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内)		
	葉かび病	1000倍								
ミニトマト	疫病	1500倍							2回以内	2回以内
なす	褐色腐敗病 すすかび病	1000倍							4回以内	4回以内
ブロッコリー	べと病								出蕾前(但し、収穫21日前まで)	2回以内
キャベツ			収穫14日前まで	2回以内	2回以内	3回以内(但し、は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及びエアゾル剤の噴射は合計2回以内)				

適用拡大登録月日：2024年10月30日

プロポーズ顆粒水和剤（ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN水和剤）

適用病害と使用方法

2024年10月30日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチアバリカルブイソプロピルを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数		
キャベツ	べと病	1000倍	100～300L/ 10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内	3回以内(但し、は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及びエアゾル剤の噴射は合計2回以内)		
はくさい	黒斑病 白さび病 白斑病 べと病			収穫7日前まで					3回以内	3回以内(但し、は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)
アスパラガス	疫病			1500倍						

適用拡大登録月日：2024年10月30日