

# ベフトップジンフロアブル（イミノクタジン酢酸塩・チオファネートメチル水和剤）

適用病害と使用方法

2022年2月9日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数
麦類(小麦を除く)	赤かび病	1000倍	60～180L/10a	収穫14日前まで	2回以内（但し、出穂期以降は1回以内）	散布	3回以内（但し、種子への処理は1回以内、散布は2回以内、出穂期以降は1回以内）	3回以内（但し、種子への処理は1回以内、出穂期以降は1回以内）
小麦	赤かび病 赤さび病 うどんこ病 葉枯症	800～1000倍			3回以内（但し、出穂期以降は1回以内）		4回以内（但し、種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は1回以内）	4回以内（但し、種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内）
	赤かび病	250倍	25L/10a					
		8倍	0.8L/10a		散布			
	雪腐大粒菌核病 紅色雪腐病	750～1000倍	60～180L/10a	根雪前				
かんきつ(みかんを除く)	貯蔵病害（青かび病） 貯蔵病害（緑かび病） 貯蔵病害（白かび病） 貯蔵病害（黒腐病） 貯蔵病害（軸腐病） 貯蔵病害（炭疽病） 貯蔵病害（黒斑病） 貯蔵病害（こうじかび病） 貯蔵病害（すす斑病）	1500倍	200～700L/10a	収穫前日まで	2回以内		2回以内	8回以内（但し、塗布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計5回以内）

# ベフトップジンフロアブル（イミノクタジン酢酸塩・チオファネートメチル水和剤）

適用病害と使用方法

2022年2月9日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数
かんきつ(みかんを除く)	貯蔵病害（青かび病） 貯蔵病害（緑かび病） 貯蔵病害（白かび病） 貯蔵病害（黒腐病） 貯蔵病害（軸腐病） 貯蔵病害（炭疽病） 貯蔵病害（黒斑病） 貯蔵病害(こうじかび病) 貯蔵病害(すす斑病)	1500倍	200～700L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	8回以内（但し、塗布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計5回以内）
		25倍	8L/10a			無人航空機による散布		
みかん		1500倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	8回以内（但し、塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内）

# ベフトップジンフロアブル（イミノクタジン酢酸塩・チオファネートメチル水和剤）

適用病害と使用方法

2022年2月9日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数
みかん	貯蔵病害（青かび病） 貯蔵病害（緑かび病） 貯蔵病害（白かび病） 貯蔵病害（黒腐病） 貯蔵病害（軸腐病） 貯蔵病害（炭疽病） 貯蔵病害（黒斑病） 貯蔵病害（こうじかび病） 貯蔵病害（すす斑病）	1500倍	200～700L/ 10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	8回以内（ 但し、塗布は3回以内、 散布、空中散布及び 無人航空機散布は合計 5回以内）
		25倍	8L/10a			無人航空機による散布		