ポリオキシンAL水和剤（ポリオキシン水和剤）

適用病害と使用方法　　2016年5月11日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ポリオキシンを含む農薬の総使用回数
きゅうり	うどんこ病	1000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
ﾒﾛﾝ					5回以内		5回以内（但し、塗布は1回以内）
ﾄﾏﾄ	灰色かび病 葉かび病				3回以内		3回以内
いちご	うどんこ病 灰色かび病			収穫開始14日前まで			
たまねぎ	灰色かび病	500～750倍		収穫3日前まで	5回以内		5回以内
	小菌核病 ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ	500倍					
にんじん	黒葉枯病			収穫7日前まで			
ねぎ	黒斑病	1000倍		収穫14日前まで	3回以内		3回以内
	ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ			発生初期（但し、収穫14日前まで）			
ﾚﾀｽ	菌核病	500倍		収穫14日前まで			
みかん	赤衣病	500～1000倍	200～700L/10a		5回以内		5回以内

ポリオキシンAL水和剤（ポリオキシン水和剤）

適用病害と使用方法　　2016年5月11日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ポリオキシンを含む農薬の総使用回数
なし	うどんこ病 褐色斑点病 黒斑病	1000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内（但し、ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ酢酸塩・ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤は3回以内）
りんご	赤衣病 うどんこ病 褐斑病 斑点落葉病			収穫3日前まで	3回以内		5回以内（但し、散布は3回以内）
ぶどう	灰色かび病	500～1000倍		収穫60日前まで	5回以内		5回以内
からまつ	先枯病		300～700L/10a	-	8回以内		8回以内