

ペンコゼブ水和剤（マンゼブ水和剤）

適用病害虫と使用方法

2024年10月30日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数	
さといも	疫病	500倍	100～300L/1	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内	
ばれいしょ	疫病 夏疫病	400～600倍	0a		10回以内		10回以内(但し、無人航空機散布は3回以内)	
	疫病	100倍	25L/10a					
やまのいも	炭疽病 葉渋病	400～600倍	100～300L/1 0a	収穫21日前まで	4回以内		4回以内	
てんさい	褐斑病				5回以内		5回以内	
		125倍	25L/10a					
にんじん	黒葉枯病	400～600倍	100～300L/1 0a	収穫7日前まで	3回以内		3回以内	
たまねぎ	黒斑病 灰色かび病 べと病			400倍	収穫3日前まで		5回以内	5回以内
	軟腐病							
にんにく	葉枯病	400～600倍		収穫7日前まで				
ねぎ	黒斑病 さび病 べと病	600倍		収穫14日前まで	3回以内	3回以内		
だいず	紫斑病	400～600倍		収穫45日前まで				
	べと病	400倍						
きゅうり	褐斑病 黒星病 炭疽病	600倍		収穫前日まで				
	べと病	600～800倍						
かぼちゃ	疫病 べと病	600倍		収穫21日前まで	2回以内	2回以内		
すいか	褐色腐敗病			収穫7日前まで	7回以内	7回以内		
	炭疽病 つる枯病	400～600倍						

適用拡大登録月日：2024年10月30日

ペンコゼブ水和剤（マンゼブ水和剤）

適用病害虫と使用方法

2024年10月30日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数
すいか	炭疽病 つる枯病	400～600倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	7回以内	散布	7回以内
メロン	つる枯病 べと病				5回以内		5回以内
トマト	疫病 葉かび病	800倍	200～700L/10a	収穫前日まで	2回以内		2回以内
キャベツ	べと病	400～600倍		収穫30日前まで	3回以内		3回以内
はくさい	黒斑病 白斑病 べと病	600倍			1回		1回
アスパラガス(露地栽培)	褐斑病 茎枯病 斑点病			500倍	収穫終了後(但し、秋期まで)		6回以内
いちご	炭疽病	600倍		仮植栽培期(但し、収穫76日前まで)			
かんきつ(みかんを除く)	汚れ果症 褐色腐敗病 そばかす病 炭疽病 チャノキイロアザミウマ		200～700L/10a	収穫90日前まで	4回以内		4回以内
	黒点病 小黒点病	600～800倍					
	シロアザミウマ	1000倍					
みかん	褐色腐敗病 そばかす病 チャノキイロアザミウマ	400～600倍		収穫30日前まで			
	黒点病	400～800倍					

適用拡大登録月日：2024年10月30日

ペンコゼブ水和剤（マンゼブ水和剤）

適用病害虫と使用方法

2024年10月30日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数
みかん	小黑点病	600～800倍	200～700L/10a	収穫30日前まで	4回以内	散布	4回以内
	そうか病	400倍					
	炭疽病	600倍					
	ミカンビダニ	1000倍					
なし	赤星病 黒星病	400～600倍			5回以内		5回以内
	黒斑病 輪紋病	600倍					
りんご	赤星病 褐斑病 黒星病 黒点病 すす点病 すす斑病 炭疽病 斑点落葉病	500～600倍			3回以内		3回以内
	輪紋病	500倍					
びわ	たてぼや病	600倍		落弁期まで	2回以内		2回以内
おうとう	灰星病			収穫21日前まで			
もも	黒星病 せん孔細菌病 果実赤点病			3回以内	3回以内		
ぶどう	晩腐病 褐斑病 黒とう病 さび病 べと病	1000倍		収穫45日前まで	2回以内		2回以内
マンゴー	炭疽病	800倍					
オリブ		600倍					

適用拡大登録月日：2024年10月30日

ペンコゼブ水和剤（マンゼブ水和剤）

適用病害虫と使用方法

2024年10月30日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数
さんしょう(果実)	さび病	600倍	200～700L/10a	最終収穫後～落葉期まで	3回以内	散布	3回以内
かき	うどんこ病	400倍		収穫45日前まで	2回以内		2回以内
	炭疽病 落葉病	400～800倍					
樹木類	炭疽病 斑点症(シュート・サ・コスポラ菌)	600倍	発病初期	4回以内		4回以内	
	枝枯細菌病		新梢伸長期～発病初期				

 適用拡大登録月日：2024年10月30日