

# アドマイヤー1粒剤（イミダクロプリド粒剤）

適用害虫と使用方法

2021年9月28日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数
稲	-	ウンカ類 ツマグロヨコバイ	3kg/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内（但し、は種時（直播）又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内）
かんしょ		コガネムシ類	6kg/10a	植付前	1回	全面土壌混和	3回以内（但し、植付前の土壌混和は1回以内、散布は2回以内）
			4～6kg/10a			作条土壌混和	
こんにゃく		アブラムシ類	6kg/10a	生育期（但し、収穫21日前まで）	2回以内	茎葉散布	3回以内（但し、培土時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内）
	3～6kg/10a		培土時（基根伸長期）	1回	株元土壌混和		
さといも ばれいしょ			4kg/10a	植付時		植溝土壌混和	3回以内（但し、植付時の土壌混和は1回以内、植付後の処理は2回以内）

# アドマイヤー1粒剤（イミダクロプリド粒剤）

適用害虫と使用方法

2021年9月28日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数	
さといも ばれいしょ	-	アブラムシ類	4kg/10a	植付時	1回	植溝土壌混和	3回以内（但し、植付時の土壌混和は1回以内、植付後の処理は2回以内）	
やまのいも		アブラムシ類 コガネムシ類						3回以内（但し、植付時までの処理は1回以内、植付後の処理は2回以内）
かぶ		アブラムシ類		は種時				播溝土壌混和
ごぼう			収穫7日前まで	2回以内	株元散布			
だいこん				3～6kg/10a	は種時	1回	播溝土壌混和	3回以内（但し、は種時の土壌混和は1回以内、は種後の処理は2回以内）

# アドマイヤー1粒剤（イミダクロプリド粒剤）

適用害虫と使用方法

2021年9月28日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数
あさつき	-	アザミウマ類	4kg/10a	定植時	1回	植溝土壌混和	3回以内（但し、定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内）
にら				収穫30日前まで		株元散布	
にら(花茎)		定植時		植溝土壌混和			
ねぎ		ネギアザミウマ		収穫30日前まで		株元散布	
		アザミウマ類		定植時		植溝土壌混和	3回以内（但し、定植時までの処理は1回以内、散布は2回以内）

# アドマイヤー1粒剤（イミダクロプリド粒剤）

適用害虫と使用方法

2021年9月28日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数
わけぎ	-	アザミウマ類	4kg/10a	定植時	1回	植溝土壌混和	3回以内（但し、定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内）
豆類（未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、未成熟そらまめを除く）		アブラムシ類	3kg/10a	は種時		播溝土壌混和	3回以内（但し、定植時及びは種時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内）
			2g/植穴（但し、6kg/10aまで）	定植時		植穴土壌混和	
えだまめ			3kg/10a	は種時		播溝土壌混和	
			2g/植穴（但し、6kg/10aまで）	定植時		植穴土壌混和	
			セル成型育苗トレイ1箱又はパーハポット1冊（30×60cm、使用土壌約1.5～4L）当り50g	は種時		本剤の所定量をセル成型育苗トレイ又はパーハポットの培土に均一に混和する	

# アドマイヤー1粒剤（イミダクロプリド粒剤）

適用害虫と使用方法

2021年9月28日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数
さやいんげん	-	アブラムシ類	1～2g/株（ 但し、6kg/10aまで）	定植時又はは種時	1回	植穴土壌混和	3回以内（但し、定植時及びは種時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内）
未成熟そらまめ			3kg/10a	は種時		播溝土壌混和	3回以内（但し、定植時及びは種時の土壌混和は合計1回以内）
			2g/植穴（但し、6kg/10aまで）	定植時		植穴土壌混和	
きゅうり			1g/株	育苗期後半		株元散布	4回以内（但し、育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び常温煙霧は合計3回以内）
	アブラムシ類 アザミウマ類	1～2g/株	定植時	植穴又は株元土壌混和			

# アドマイヤー1粒剤（イミダクロプリド粒剤）

適用害虫と使用方法

2021年9月28日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数
きゅうり	-	アブラムシ類 アザミウマ類	1～2g/株	定植時	1回	植穴又は株元土 壤混和	4回以内（但し、育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び常温煙霧は合計3回以内）
		コナジラミ類	2g/株			植穴土壌混和	
にがうり		アブラムシ類	1～2g/株			植穴又は株元土 壤混和	2回以内（但し、定植時の土壌混和は1回以内）
かぼちゃ		コナジラミ類 アザミウマ類	2g/株			植穴土壌混和	3回以内（但し、定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内）
すいか		アブラムシ類	5g/株（但し、3kg/10aまで）			株元土壌混和	4回以内（但し、定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内）
		1～5g/株（但し、3kg/10aまで）	植穴土壌混和				

# アドマイヤー1粒剤（イミダクロプリド粒剤）

適用害虫と使用方法

2021年9月28日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数
すいか	-	アブラムシ類	1～5g/株（ 但し、3kg/10aまで）	定植時	1回	植穴土壌混和	4回以内（但し、定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内）
		アザミウマ類	1～2g/株（ 但し、3kg/10aまで）				
まくわうり	-	アブラムシ類	1g/株	育苗期後半	1回	株元散布	4回以内（但し、育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内）
メロン							
トマト		コナジラミ類	2g/株	植穴土壌混和		3回以内（但し、育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内）	
		アブラムシ類 コナジラミ類	1～2g/株				

# アドマイヤー1粒剤（イミダクロプリド粒剤）

適用害虫と使用方法

2021年9月28日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数
トマト	-	アブラムシ類 コナジラミ類	1～2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内（但し、育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内）
		コナジラミ類	0.5～1g/株	育苗期後半		株元散布	
ミニトマト	-	アブラムシ類 コナジラミ類	1～2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内（但し、育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び常温煙霧は合計2回以内）
		コナジラミ類	0.5～1g/株	育苗期後半		株元散布	
なす	-	アブラムシ類	1g/株		1回		3回以内（但し、育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び常温煙霧は合計2回以内）
		アブラムシ類 アザミウマ類	1～2g/株	定植時		植穴又は株元土壌混和	
ピーマン	-	アブラムシ類	1g/株	育苗期後半	1回	株元散布	3回以内（但し、育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内）



# アドマイヤー1粒剤（イミダクロプリド粒剤）

適用害虫と使用方法

2021年9月28日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数
ピーマン	-	アブラムシ類	1g/株	育苗期後半	1回	株元散布	3回以内（但し、育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内）
		アブラムシ類 アザミウマ類	1～2g/株	定植時		植穴又は株元土壌混和	
		アブラムシ類	1g/株	育苗期後半		株元散布	
		アブラムシ類 アザミウマ類	1～2g/株	定植時		植穴又は株元土壌混和	
とうがらし類		アブラムシ類	0.5g/株			植穴土壌混和	4回以内（但し、育苗期の灌水は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、定植後の処理は2回以内）

# アドマイヤー1粒剤（イミダクロプリド粒剤）

適用害虫と使用方法

2021年9月28日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数
キャベツ はくさい	-	アブラムシ類	0.5g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内（但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内）
			3kg/10a	収穫14日前まで		株元散布	
パセリ	-	アブラムシ類 アザミウマ類	0.5g/株	は種時		播溝散布	2回以内（但し、定植時までの処理は1回以内、散布は1回以内）
				定植時		植穴土壌混和	
レタス	-	アブラムシ類		育苗期後半		株元散布	3回以内（但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内）

# アドマイヤー1粒剤（イミダクロプリド粒剤）

適用害虫と使用方法

2021年9月28日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数	
ほうれんそう	-	アブラムシ類	4kg/10a	は種時	1回	播溝土壌混和	3回以内（但し、は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内）	
さといも(葉柄)				植付時		植溝土壌混和		3回以内（但し、植付時の土壌混和は1回以内、植付後の処理は2回以内）
いちご				育苗期後半 定植時		株元散布 植穴土壌混和		
じゅんさい	じゅんさい田	エスリカ類	3kg/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	
やまのいも(むかご)	-	コガネムシ類	4kg/10a	植付時	1回	植溝土壌混和	1回	
れんこん		クイビレアブラムシ		収穫14日前まで	2回以内	散布	3回以内（但し、植付時の土壌混和は1回以内、植付後の処理は2回以内）	

# アドマイヤー1粒剤（イミダクロプリド粒剤）

適用害虫と使用方法

2021年9月28日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数		
れんこん	-	クイクビレアラムシ	4kg/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	3回以内（但し、植付時の土壌混和は1回以内、植付後の処理は2回以内）		
		クイクビレアラムシ イネクイハムシ	3kg/10a	植付時		1回		植溝土壌混和	
かんきつ(苗木)	-	ミカンハモグリガ	20g/樹（但し、6kg/10aまで）	育苗期	5回以内	株元散布	1回		
花き類・観葉植物(きく、ばら、ハチユニア、レザ-ファンを除く)		アラムシ類	2g/株（但し、6kg/10aまで）	生育期		散布	株元散布	5回以内	
きく		アザミウマ類	3kg/10a	定植時					
ばら		アラムシ類	2g/株（但し、6kg/10aまで）						株元土壌混和
		イバラヒゲナガアラムシ							
ハチユニア		アラムシ類	1g/株（但し、3kg/10aまで）	1回		植穴土壌混和			
レザ-ファン				2g/株（但し、6kg/10aまで）		生育期	株元散布		
			アザミウマ類	1g/株（但し、3kg/10aまで）			株元土壌混和		

# アドマイヤー1粒剤（イミダクロプリド粒剤）

適用害虫と使用方法

2021年9月28日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数
レザ-ファン	-	アザミウマ類	1g/株（但し、3kg/10aまで）	生育期	5回以内	株元土壌混和	5回以内
樹木類（つつじ類を除く）		コガネムシ類	4kg/10a	植付時	2回以内	作条土壌混和	2回以内
ポインセチア		アブラムシ類	2g/株（但し、6kg/10aまで）	生育期	5回以内	株元散布	5回以内
		コナジラミ類	1g/株（但し、3kg/10aまで）			株元土壌混和	
つつじ類		コガネムシ類	4kg/10a	植付時又は植替時	2回以内	作条土壌混和	5回以内（但し、株元灌注は2回以内、土壌混和は2回以内）
		ツツジケンバイ	6kg/10a	発生初期	5回以内	株元散布	
ごま		アブラムシ類	3kg/10a	は種時	1回	播溝土壌混和	1回
たばこ			3kg/10a（1g/株）	植付時		植穴土壌混和	2回以内（但し、植付時の土壌混和は1回以内、散布は1回以内）