

# サターンバアロ粒剤（プロメトリン・ベンチオカーブ粒剤）

適用雑草と使用方法

2019年9月11日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	プロメトリンを含む農薬の総使用回数	ベンチオカーブを含む農薬の総使用回数				
直播水稻	マツバイ 一年生雑草	は種直後～稲出芽前（ルビ発生始期まで）（入水15日前まで）	4～6kg/10a	1回	乾田・落水状態で全面土壌散布	1回	2回以内（但し、入水前は1回以内、入水後は1回以内）				
小麦	一年生雑草	は種後～出芽前（雑草発生前）	3～6kg/10a	1回	全面土壌散布	2回以内	1回				
		生育初期（小麦の4葉期まで、スズメノテハウ1.5葉期まで）	3～5kg/10a								
大麦		生育初期（大麦の4葉期まで、スズメノテハウ1.5葉期まで）									
		は種後～出芽前（雑草発生前）									
とうもろこし		は種直後	4～6kg/10a								
たまねぎ		定植直後（雑草発生始期まで）									
にんじん		は種直後（雑草発生前）									
ねぎ		定植直後（雑草発生始期まで）	4～5kg/10a								
つつじ類 つばき類		植付後（雑草発生前）	4～6kg/10a					3回以内		3回以内	3回以内

# サターンバアロ粒剤（プロメトリン・ベンチオカーブ粒剤）

適用雑草と使用方法

2019年9月11日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	プロメトリンを含む農薬の総使用回数	ベンチオカーブを含む農薬の総使用回数
だいず	一年生雑草	は種後～出芽前 (雑草発生前)	4～6kg/10a	1回	全面土壌散布	1回	1回
らっかせい						2回以内	
桑		春期発芽前又は夏切後 (雑草発生前)	5～6kg/10a	2回以内		2回以内	