

# クミメートSM1キロ粒剤（シメトリン・ピリミノバックメチル・ベンフレセート・MCPB粒剤）

適用雑草と使用方法

2012年4月25日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	シメトリンを含む農薬の総使用回数	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ベンフレセートを含む農薬の総使用回数	MCPBを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカ クダマヅ(北海道を除く) ヒルムシロ ハラオモダカ(北海道、東北、九州) ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ(北海道を除く)	移植後20日～ルビ3.5葉期（但し、収穫60日前まで）	壤土～埴土	1kg/10a	1回	湛水散布	九州の早期栽培地帯	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内
	砂壤土～埴土		全域（九州を除く）の普通期及び早期栽培地帯								

# クミメートSM1キロ粒剤（シメトリン・ピリミノバックメチル・ベンフレセート・MCPB粒剤）

適用雑草と使用方法

2012年4月25日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	シメトリンを含む農薬の総使用回数	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ベンフレセートを含む農薬の総使用回数	MCPBを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカ ホトカ(東北、関東・東山・東海) カゲヅ(北海道を除く) シズイ(東北) ヒルムシロ ハラホトカ(北海道、東北、九州) ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ(北海道を除く) アオシロ・藻類による表層はく離(九州を除く)	移植後20日～ レI3.5葉期(但し、 収穫60日前まで)	砂壤土～ 埴土	1kg/10a	1回	湛水散布	全域(九州を除く)の普通期及び早期栽培地帯	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内
直播水稻	水田一年生雑草 ウリカ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ	稲5葉期～ レI3.5葉期(但し、 収穫60日前まで)	壤土～ 埴土				全域(九州を除く)				