

パスポート顆粒水和剤（TPN水和剤）

適用病害と使用方法

2025年3月12日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
西洋なし	褐色斑点病 ごま色斑点病	1000倍	200～700L/10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内
西洋なし なし(西洋なしを除く)	黒星病			収穫後～落葉終了まで			
りんご	褐斑病 黒点病 すす点病 すす斑病 炭疽病 斑点落葉病 輪紋病			収穫45日前まで			
	黒星病 モリア病	1000～1500倍					
もも	黒星病 灰星病 果実赤点病	1000倍		収穫前日まで	6回以内		6回以内
ぶどう	晩腐病 黒とう病	250～400倍	100～300L/10a	休眠期	1回		3回以内(但し、休眠期は1回以内)
パッションフルーツ	円斑病	1500倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	3回以内		3回以内
いちじく	疫病 さび病	3000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内
かき	うどんこ病 炭疽病 落葉病	1500倍		収穫30日前まで	3回以内		3回以内
キウイフルーツ	果実軟腐病	1000倍		収穫60日前まで	7回以内		7回以内

適用拡大登録月日：2025年03月12日