

コルト顆粒水和剤（ピリフルキナゾン水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年8月28日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリフルキナゾンを含む農薬の総使用回数
未成熟とうもろこし	アブラムシ類	4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
かんしょ	アブラムシ類 コナジラミ類						
こんにゃく	アブラムシ類						
ばれいしょ		4000～8000倍					
		400倍	25L/10a			無人航空機による散布	
		50倍	3.2L/10a			無人航空機による散布	
やまのいも		4000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで		散布	
てんさい		4000～6000倍					
		32倍	1.6L/10a				
		40倍	2L/10a				
		64倍	3.2L/10a				
たまねぎ	ネギアザミマ ネギハモグリバエ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
にら	ネギアザミマ						
ねぎ	アブラムシ類 ネギアザミマ ネギハモグリバエ						
		16倍	1.6L/10a	収穫3日前まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		20倍	2L/10a				
		32倍	3.2L/10a				
豆類(種実、ただし、らっかせいを除く)	アブラムシ類	4000～6000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで		散布	
豆類(未成熟、ただし、さやいんげんを除く) さやいんげん				収穫前日まで			

適用拡大登録月日：2024年08月28日

コルト顆粒水和剤（ピリフルキナゾン水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年8月28日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリフルキナゾンを含む農薬の総使用回数	
豆類(未成熟、ただし、 さやいんげんを除く) さやいんげん	アブラムシ類	4000～6000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
さやいんげん	コナジラミ類	4000倍						
きゅうり	アブラムシ類 コナジラミ類							
しろうり	コナジラミ類							
ズッキーニ にがうり	アブラムシ類							
かぼちゃ すいか メロン	アブラムシ類 コナジラミ類							
しょくようほおずき	コナジラミ類							収穫3日前まで
トマト ミニトマト	アブラムシ類 コナジラミ類							収穫前日まで
なす	アブラムシ類 コナジラミ類 カスミカメムシ類							
ピーマン とうがらし類(甘長とうがらしを除く)	アブラムシ類 コナジラミ類							2回以内
甘長とうがらし		3回以内						
カリフラワー ブロッコリー	アブラムシ類	32倍	2L/10a			無人航空機による散布		
ブロッコリー								

適用拡大登録月日：2024年08月28日

コルト顆粒水和剤（ピリフルキナゾン水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年8月28日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリフルキナゾンを含む農薬の総使用回数		
ブロッコリー	アブラムシ類	25倍	1.6L/10a	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内		
		50倍	3.2L/10a						
キャベツ	アブラムシ類	3000～4000倍	100～300L/10a					無人航空機による散布	
		20倍	2L/10a						
		32倍	3.2L/10a						
		16倍	1.6L/10a						
	ネギアザミマ	3000倍	100～300L/10a					無人航空機による散布	
はくさい	アブラムシ類	4000倍	0a					収穫3日前まで	無人航空機による散布
		48倍	3.2L/10a						
		30倍	2L/10a						
		24倍	1.6L/10a						
レタス	アブラムシ類	3000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	無人航空機による散布				
		30倍	2L/10a						
		48倍	3.2L/10a						
		24倍	1.6L/10a						
非結球レタス	アブラムシ類	3000～4000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	無人航空機による散布				
		48倍	3.2L/10a						
		30倍	2L/10a						
		24倍	1.6L/10a						
アスパラガス	コナジラミ類 ネギアザミマ カスミカメムシ類	4000倍	100～700L/10a	収穫前日まで	無人航空機による散布				
食用パンプキン	アブラムシ類		100～300L/10a	収穫14日前まで	2回以内	2回以内			

適用拡大登録月日：2024年08月28日

コルト顆粒水和剤（ピリフルキナゾン水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年8月28日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリフルキナゾンを含む農薬の総使用回数
いちご	アブラムシ類 コナジラミ類	3000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
オクラ		4000倍					
ヤングコーン	アブラムシ類				1回		
かんきつ			200～700L/10a		3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		40倍	10L/10a				
		20倍	5L/10a				
		16倍	4L/10a				
		カイガラムシ類(アカマルカイガラムシを除く)	2000～3000倍		200～700L/10a	散布	
		アカマルカイガラムシ	2000倍				
	コナジラミ類 チャノキイロアザミウマ ミカンバエ成虫	3000倍					
なし	アブラムシ類 チュウゴクナシジラミ	4000倍					
	カイガラムシ類	3000～4000倍					
	チャノキイロアザミウマ	3000倍					
りんご	アブラムシ類	3000～6000倍					
	カイガラムシ類	3000～4000倍					
	リンゴワタムシ	3000倍					
おうとう	カイガラムシ類	2000倍					
	オウトウショウジヨウバエ	10000倍					

適用拡大登録月日：2024年08月28日

コルト顆粒水和剤（ピリフルキナゾン水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年8月28日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリフルキナゾンを含む農薬の総使用回数
もも	アブラムシ類	4000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	カイガラムシ類	2000～3000倍					
ネクタリン	アブラムシ類	4000倍					
	カイガラムシ類	2000～3000倍					
小粒核果類	アブラムシ類	2000～4000倍					
	カイガラムシ類	2000倍					
ぶどう	カイガラムシ類 チャノキイロアザミウマ ツマゲロアオカスミカメ	3000倍					
マンゴー	チャノキイロアザミウマ	2000倍					
かき	カイガラムシ類 チャノキイロアザミウマ	2000～3000倍					
キウイフルーツ	クワシロカイガラムシ	3000倍					
花き類・観葉植物(チューリップ°を除く) チューリップ°	アブラムシ類 コナジラミ類	4000倍	100～300L/10a	発生初期	4回以内	無人航空機による散布	4回以内
チューリップ°	アブラムシ類	40～120倍	3L/10a				
茶	アブラムシ類 チャトゲコナジラミ チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ	2000～3000倍	200～400L/10a	摘採7日前まで	2回以内	散布	2回以内
	クワシロカイガラムシ		1000L/10a				


適用拡大登録月日：2024年08月28日

コルト顆粒水和剤（ピリフルキナゾン水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年8月28日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリフルキナゾンを含む農薬の総使用回数
茶	マダラカサハラハムシ ツマゲロアオカスミカメ	2000倍	200～400L/10a	摘採7日前まで	2回以内	散布	2回以内
たばこ	アブラムシ類	4000倍	25～180L/10a	収穫10日前まで			

 適用拡大登録月日：2024年08月28日