適用害虫と使用方法

2025年6月25日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用 回数	使用方法	ピリフルキナゾ ンを含む農薬の 総使用回数
未成熟とうもろこし	アブラムシ類	4000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
		64倍	1.6~3.2L/1			無人航空機によ	
			0a			る散布	
かんしょ	アブラムシ類	4000倍	100~300L/1			散布]
	コナシ゛ラミ類		0a				
こんにゃく	アブラムシ類						
ばれいしょ	7	4000~8000倍					
		400倍	25L/10a				
		50倍	3.2L/10a			無人航空機によ	1
						る散布	
やまのいも	7	4000倍	100~300L/1			散布	1
てんさい	7	4000~6000倍	0a	収穫7日前まで	1		
		32倍	1.6L/10a			無人航空機によ]
		40倍	2L/10a			る散布	
		64倍	3.2L/10a				
たまねぎ	ネキ゛アサ゛ミウマ	2000倍	100~300L/1	収穫前日まで	1	散布	1
	ネキ゛ハモク゛リハ゛ェ		0a				
にら	アブラムシ類	2000~4000倍			2回以内	1	2回以内
	ネキ゛アサ゛ミウマ	2000倍					
ねぎ	アブラムシ類	7		収穫3日前まで	3回以内	1	3回以内
	ネキ゛アサ゛ミウマ	16倍	1.6L/10a			無人航空機によ	1
	ネキ゛ハモク゛リハ゛ェ	32倍	3.2L/10a			る散布	
		20倍	2L/10a				

□適用拡大登録月日:2025年06月25日

適用害虫と使用方法

2025年6月25日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用 回数	使用方法	ピリフルキナゾ ンを含む農薬の 総使用回数
豆類(種実、ただし、らっかせいを除く)	アフ゛ラムシ類	4000~6000 倍	100~300L/1 0a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
豆類(未成熟、ただし、 さやいんげんを除く) さやいんげん				収穫前日まで			
さやいんげん	コナジラミ類	4000倍	1				
きゅうり	アブラムシ類 コナジラミ類						
しろうり	コナジラミ類	1					
ス゛ッキーニ	アブラムシ類 コナジラミ類						
にがうり	アブラムシ類	1					
かぼちゃ すいか 刈ン	アブラムシ類 コナジラミ類						
しょくようほおずき	コナジラミ類	1		収穫3日前まで	1		
 	アブラムシ類 コナジラミ類			収穫前日まで			
なす	アフ゛ラムシ類 コナシ゛ラミ類 カスミカメムシ類						
ピーマン とうがらし類(甘長と うがらしを除く)	アフ゛ラムシ類 コナシ゛ラミ類				2回以内		2回以内

適用拡大登録月日:2025年06月25日

適用害虫と使用方法

2025年6月25日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用 回数	使用方法	ピリフルキナゾ ンを含む農薬の 総使用回数
ピーマン とうがらし類(甘長と うがらしを除く)	アフ゛ラムシ類 コナシ゛ラミ類	4000倍	100~300L/1 0a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
甘長とうがらし カツフラワー プロッユリー	- アブラムシ類				3回以内		3回以内
フ゛ロッコリー		25倍	1.6L/10a			無人航空機によ	-
		32倍	2L/10a			る散布	
		50倍	3.2L/10a				
キャヘ゛ツ		3000~4000倍	100~300L/10a			散布	1
		16倍	1.6L/10a			無人航空機によ	-
		20倍	2L/10a			る散布	
		32倍	3.2L/10a				
	ネギアザミウマ	3000倍	100~300L/1			散布	-
はくさい	アブラムシ類	4000倍	0a	収穫3日前まで	1		
		48倍	3.2L/10a			無人航空機によ	
		24倍	1.6L/10a			る散布	
		30倍	2L/10a				
レタス		3000~4000倍	100~300L/10a	収穫前日まで		散布	
		24倍	1.6L/10a			無人航空機によ]
		48倍	3.2L/10a			る散布	
		30倍	2L/10a				
非結球レタス]	3000~4000倍	100~300L/10a	収穫7日前まで	7	散布]
		24倍	1.6L/10a			無人航空機によ る散布	

□適用拡大登録月日:2025年06月25日

適用害虫と使用方法

2025年6月25日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用 回数	使用方法	ピリフルキナゾ ンを含む農薬の 総使用回数
非結球レタス	アブラムシ類	30倍	2L/10a	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機によ る散布	3回以内
		48倍	3.2L/10a				
アスハ゜ラカ゛ス	コナシ゛ラミ類 ネキ゛アサ゛ミウマ カスミカメムシ類	4000倍	100~700L/1 0a	収穫前日まで		散布	
食用ペンタス	アブラムシ類	1	100~300L/1	収穫14日前まで	2回以内		2回以内
いちご	アブラムシ類	3000~4000倍	0a	収穫前日まで	3回以内		3回以内
オクラ	コナジラミ類	4000倍					
ヤング゛コーン	アブラムシ類				10		10
かんきつ			200~700L/10a		3回以内		3回以内
		16倍	4L/10a			無人航空機によ	
		20倍	5L/10a			る散布	
		40倍	10L/10a				
	カイカ゛ラムシ類(アカマルカイカ゛	2000~3000	200~700L/1			散布	
	ラムシを除く)	倍	0a				
	アカマルカイカ゛ラムシ	2000倍					
	コナシ゛ラミ類 チャノキイロアサ゛ミウマ ミカンハ゛ェ成虫	3000倍					
なし	アフ゛ラムシ類 チュウコ゛クナシキシ゛ラミ	4000倍					
	カイカ゛ラムシ類	3000~4000倍					
	チャノキイロアサ゛ミウマ	3000倍					

□適用拡大登録月日:2025年06月25日

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用 回数	使用方法	ピリフルキナゾ ンを含む農薬の 総使用回数
りんご	アブラムシ類	3000~6000倍	200~700L/1	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	カイカ゛ラムシ類	3000~4000倍]0a				
	リンコ゛ワタムシ	3000倍]				
おうとう	カイカ゛ラムシ類	2000倍]				
	オウトウショウシ゛ョウハ゛エ	10000倍]				
もも	アブラムシ類	4000倍	1				
	カイカ゛ラムシ類	2000~3000倍					
ネクタリン	アブラムシ類	4000倍	1				
	カイカ゛ラムシ類	2000~3000倍	1				
小粒核果類	アブラムシ類	2000~4000倍	1				
	カイカ゛ラムシ類	2000倍	1				
ぶどう	カイカ゛ラムシ類	3000倍]				
	チャノキイロアサ゛ミウマ						
	ツマク゛ロアオカスミカメ						
マンコ゛ー	カイカ゛ラムシ類	2000倍					
かき	チャノキイロアサ゛ミウマ	2000~3000倍					
キウイフルーツ	カイカ゛ラムシ類	3000倍	1				
花き類・観葉植物(チュー	アブラムシ類	4000倍	100~300L/1	発生初期	4回以内		4回以内
リッフ [°] を除く)	コナシ゛ラミ類		0a				
チューリッフ゜							
チューリッフ゜	アブラムシ類	40~120倍	3L/10a			無人航空機によ]
						る散布	
茶	アブラムシ類 チャトゲコナジラミ	2000~3000	200~400L/1	摘採7日前まで	2回以内	散布	2回以内
	チャノキイロアサ゛ミウマ チャノミト゛リヒメヨコハ゛イ	倍	0a				

☑ 適用拡大登録月日:2025年06月25日

2025年6月25日現在

適用害虫と使用方法 2025年6月25日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用 回数	使用方法	ピリフルキナゾ ンを含む農薬の 総使用回数
茶	アフ゛ラムシ類 チャトケ゛コナシ゛ラミ チャノキイロアサ゛ミウマ チャノミト゛リヒメヨコハ゛イ	2000~3000 倍	200~400L/1 0a	摘採7日前まで	2回以内	散布	2回以内
	クワシロカイカ゛ラムシ		1000L/10a				
	マタ゛ラカサハラハムシ ツマク゛ロアオカスミカメ	2000倍	200~400L/1 0a				
たばこ	アブラムシ類	4000倍	25~180L/10a	収穫10日前まで			