

マイウェイ豆つぶ250（オキサジクロメホン・ピリミスルファン剤）

適用雑草と使用方法

2012年4月11日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数	ピリミスルファンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカ セリ ヒルムシロ ハラモダカ(北海道、東北) ホタルイ マツバイ	移植後3日～ ル ¹ E2.5葉期 (但し、移植後30日まで)	壤土～埴土	250g/10a	1回	湛水散布又は湛水周縁散布	北海道	2回以内	2回以内
	砂壤土～埴土		全域（北海道を除く）の普通期及び早期栽培地帯						

マイウェイ豆つぶ250（オキサジクロメホン・ピリミスルファン剤）

適用雑草と使用方法

2012年4月11日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数	ピリミスルファンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	<small>○イネ科雑草 ○アザミ科雑草 ○シロネ科雑草 ○クサビ科雑草 ○トウモロコシ科雑草 ○アザミ科雑草 ○シロネ科雑草 ○クサビ科雑草 ○トウモロコシ科雑草</small>	移植後3日～ル・I2.5葉期（ 但し、移植後30日まで）	砂壤土～埴土	250g/10a	1回	湛水散布又は湛水周縁 散布	全域（北海道を除く）の 普通期及び早期栽培地帯	2回以内	2回以内