

ジョイスターフロアブル（カフェンストロール・シハロホップブチル・ダイムロン・ベンスルフロン

適用雑草と使用方法

2007年8月15日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	カフェンストロールを含む農薬の総使用回数	シハロホップブチルを含む農薬の総使用回数	ダイムロンを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカ エゾノヤヌカガサ(北海道) オモダカ クワグワイ(東北) コウキヤガラ(東北) シズイ(東北) セリ ヒルムシロ ハラオモダカ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ(東北) アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後5日～ル ¹ I3葉期(但し、移植後30日まで)	砂壤土～埴土	500ml/10a	1回	原液湛水散布又は水口施用	北海道、東北	1回	3回以内	3回以内(但し、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)	2回以内

ジョイスターフロアブル（カフェンストロール・シハロホップブチル・ダイムロン・ベンスルフロン

適用雑草と使用方法

2007年8月15日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	カフェンストロールを含む農薬の総使用回数	シハロホップブチルを含む農薬の総使用回数	ダイムロンを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
移植水稻		移植後5日～13葉期（但し、移植後30日まで）	砂壤土～埴土	500ml/10a	1回	原液湛水散布又は水口施用	北海道、東北	1回	3回以内	3回以内（但し、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内）	2回以内