

ゴーゴーサン乳剤（ペンディメタリン乳剤）

適用雑草と使用方法

2024年4月10日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数	
陸稲	一年生雑草	は種後出芽前(雑草発生前)	200~400mL/10a	70~150L/10a	1回	全面土壌散布	1回	
麦類(大麦、小麦を除く)			300~500mL/10a	70~100L/10a		雑草茎葉散布又は全面土壌散布		
小麦		は種後(雑草発生前)~小麦2葉期(1科雑草1葉期まで)	10a	70~100L/10a		全面土壌散布		
大麦		生育期(雑草発生前)但し収穫60日前まで						
とうもろこし		は種後出芽前(雑草発生前)						70~150L/10a
かんしょ		挿苗10日後まで(雑草発生前)	200~400mL/10a	100L/10a		畦間土壌散布		
こんにゃく		植付後又は培土後(雑草発生前)(但し、植付30日後まで)	200~300mL/10a	70~100L/10a		全面土壌散布		
さといも		土寄せ後(雑草発生前)(但し、収穫60日前まで)	200~400mL/10a	100L/10a		全面土壌散布		2回以内(但し、土寄せ後の処理は1回以内)
ばれいしょ		植付後萌芽前(雑草発生前)		70~100L/10a				
やまのいも			200~300mL/10a	100L/10a		1回		
甘草	定植後(雑草発生前)(但し、収穫90日前まで)	300mL/10a		3回以内(但し、1年間に1回以内)	3回以内(但し、1年間に1回以内)			

適用拡大登録月日：2024年04月10日

ゴーゴーサン乳剤（ペンディメタリン乳剤）

適用雑草と使用方法

2024年4月10日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数
甘草	一年生雑草	定植後(雑草発生前)(但し、収穫90日前まで)	300mL/10a	100L/10a	3回以内(但し、1年間に1回以内)	全面土壌散布	3回以内(但し、1年間に1回以内)
		越冬後萌芽前(雑草発生前)					
		は種後出芽前(雑草発生前)					
しょうが	一年生雑草	植付後萌芽前(雑草発生前)	200~400mL/10a	70~150L/10a	1回	全面土壌散布	1回
にんじん		は種後出芽前(雑草発生前)					
たまねぎ(直播栽培)		は種後~本葉2葉期(雑草発生前)	70~100L/10a				
たまねぎ(移植栽培)		定植前(雑草発生前)	300~500mL/10a	70~150L/10a			
		定植後(雑草発生前)(但し、収穫30日前まで)					
葉たまねぎ		定植前(雑草発生前)					
にんにく	植付前(マルチ前)						
	植付後(雑草発生前)(但し、収穫60日前まで)		70~100L/10a				


適用拡大登録月日：2024年04月10日

ゴーゴーサン乳剤（ペンディメタリン乳剤）

適用雑草と使用方法

2024年4月10日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数	
にんにく	一年生雑草	植付後(雑草発生前)(但し、収穫60日前まで)	300~500mL/10a	70~100L/10a	1回	全面土壌散布	1回	
葉にんにく(マルチ栽培)		植付前(マルチ前)	400~500mL/10a	70~150L/10a				
葉にんにく(マルチ栽培を除く)		植付後(雑草発生前)(但し、収穫60日前まで)	300~400mL/10a	100L/10a				
らっきょう		植付前	400~500mL/10a	70~150L/10a				
		植付後萌芽前(雑草発生前)	300~500mL/10a	a				
にら		定植後(雑草発生前)(但し、定植10日後まで)	200~300mL/10a	100L/10a				
		収穫30日前まで(雑草発生前)						畦間土壌散布
ねぎ		定植後(雑草発生前)(但し、定植10日後まで)		70~100L/10a				全面土壌散布
らっかせい		は種後出芽前(雑草発生前)		70~150L/10a				
カリフラワー キャベツ		定植前(雑草発生前)	200~400mL/10a					
はくさい		200~300mL/10a						

 適用拡大登録月日：2024年04月10日

ゴーゴーサン乳剤（ペンディメタリン乳剤）

適用雑草と使用方法

2024年4月10日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数
レタス 非結球レタス	一年生雑草	定植前(雑草発生前)	200～400mL/ 10a	70～150L/10 a	1回	全面土壌散布	1回
アスパラガス		萌芽前(雑草発生前)					
うど		定植後萌芽前(根株養成圃)(雑草発生前)	400mL/10a	100L/10a			
		生育期(根株養成圃)(雑草発生前)(但し、収穫60日前まで)					
ふき(春どり露地栽培)		春期収穫直後から萌芽前まで(雑草発生前)	200～400mL/ 10a	70～150L/10 a		全面土壌散布	1回
食用ぎく		定植前(雑草発生前)					
ふき(ふきのとう)		春期ふき収穫直後から萌芽前まで(雑草発生前)	400mL/10a				
ヤングコーン		は種後出芽前(雑草発生前)	200～400mL/ 10a				
おけら		収穫60日前まで(雑草発生前)	200～300mL/ 10a			3回以内(但し、1年間に1回以内)	3回以内(但し、1年間に1回以内)


適用拡大登録月日：2024年04月10日

ゴーゴーサン乳剤（ペンディメタリン乳剤）

適用雑草と使用方法

2024年4月10日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数
おけら	一年生雑草	収穫60日前まで (雑草発生前)	200～300mL/ 10a	70～150L/10 a	3回以内(但し、1年間に1回以内)	全面土壌散布	3回以内(但し、1年間に1回以内)
せんきゅう		萌芽後(雑草発生前)(但し、収穫120日前まで)	300mL/10a	100L/10a	1回		1回
とうき		定植後(雑草発生前)(但し、収穫120日前まで)					
とりかぶと(薬用)		生育期(雑草発生前)(但し、収穫90日前まで)	300～500mL/ 10a				
みしまさいこ とうすけぼうふう びやくし		は種後出芽前(雑草発生前)	300mL/10a	70～150L/10 a			
いんちんこう		定植後(雑草発生前)(但し、収穫120日前まで)		100L/10a			
きく		定植後(雑草発生前)	200～400mL/ 10a	70～150L/10 a			
		定植前(雑草発生前)					
チューリップ°		植付後萌芽前(雑草発生前)	300～500mL/ 10a				


 適用拡大登録月日：2024年04月10日

ゴーゴーサン乳剤（ペンディメタリン乳剤）

適用雑草と使用方法

2024年4月10日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数
チューリップ°	一年生雑草	植付後萌芽前(雑草発生前)	300～500mL/10a	70～150L/10a	1回	全面土壌散布	1回
りんどう		萌芽前(雑草発生前)	200～400mL/10a				
すぎ(床替床) ひのき(床替床)		床替後(雑草発生前)	400～500mL/10a				
ワカメ		ワカメ3葉期(雑草発生前～発生始期)	300mL/10a	70～100L/10a	雑草茎葉散布又は全面土壌散布		
飼料用とうもろこし		は種後出芽前(雑草発生前)	300～400mL/10a 200～400mL/10a	70～150L/10a		全面土壌散布	
桑		春期発芽前又は夏切り後(雑草発生前)	300～400mL/10a	100～200L/10a	2回以内	2回以内	

 適用拡大登録月日：2024年04月10日