

ウルフェース 1 キロ粒剤 5 1 (ベンスルフロンメチル・ベンチオカーブ・メフェナセット粒剤)

適用雑草と使用方法

2012年10月24日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ベンチオカーブを含む農薬の総使用回数	メフェナセットを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカ トゲカ クダマ コウキガラ(九州) セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植直後～ ルビエ2.5葉期(但し、 移植後30日まで)	砂壤土～ 埴土(但し、移植 直後～移植後4日の 砂壤土は除く)	1kg/10a	1回	湛水散布	全域(北海道、東北を除く)の普通期及び早期栽培地帯	2回以内	1回	2回以内
		移植時				埴土～埴土				
直播水稻	水田一年生雑草 ウリカ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ アオミドロ・藻類による表層はく離	稲1葉期～ ルビエ2.5葉期(但し、 収穫90日前まで)				湛水散布	全域(北海道、東北を除く)		2回以内(但し、入水前は1回以内、入水後は1回以内)	

