

ウルフェース粒剤 17 (ベンスルフロンメチル・ベンチオカーブ・メフェナセット粒剤)

適用雑草と使用方法

2012年10月24日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ベンチオカーブを含む農薬の総使用回数	メフェナセットを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカ オモダカ クダマ コウキガラ(九州) セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバ ミスガヤツリ アミドロ・藻類による表層はく離	移植直後～ ルビ2葉期 (但し、移植後30日まで)	砂壤土～ 埴土(但し、移植直後～移植後4日の砂壤土は除く)	3kg/10a	1回	湛水散布	関東・東山・東海、近畿・中国・四国、九州の早期栽培地帯	2回以内	1回	2回以内
	水田一年生雑草 ウリカ オモダカ クダマ コウキガラ(九州) セリ ヒルムシロ ハラオモダカ(北陸) ホタルイ マツバ ミスガヤツリ アミドロ・藻類による表層はく離	移植直後～ ルビ2.5葉期(但し、移植後30日まで)					全域(北海道、東北を除く)の普通期栽培地帯			

ウルフェース粒剤 17 (ベンスルフロンメチル・ベンチオカーブ・メフェナセット粒剤)

適用雑草と使用方法

2012年10月24日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ベンチオカーブを含む農薬の総使用回数	メフェナセットを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカワ オモダカ クワグワイ コウキヤガラ(九州) セリ ヒルムシロ ハラオモダカ(北陸) ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植直後～ ルビE2.5葉 期(但し、 移植後30日 まで)	砂壤土～ 埴土(但 し、移植 直後～移 植後4日の 砂壤土は 除く)	3kg/10a	1回	湛水散布	全域(北 海道、東 北を除く)の普通 期栽培地 帯	2回以内	1回	2回以内
直播水稻	水田一年生雑草 ウリカワ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ アオミドロ・藻類に よる表層はく離	稲1葉期～ノ ビE2葉期(但 し、収穫 90日前まで)	壤土～埴 土				北陸、関 東・東山 ・東海、 近畿・中 国・四国		2回以内(但 し、入 水前は1回 以内、入 水後は1回 以内)	