

ファンタジスタ顆粒水和剤（ピリベンカルブ水和剤）

適用病害と使用方法

2025年4月9日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	2000倍	60～150L/10a	収穫30日前まで	1回	散布	1回
小麦	赤かび病	2000～4000倍	a	収穫14日前まで	3回以内		3回以内
	赤さび病 眼紋病	2000倍					
にんじん	うどんこ病 菌核病 黒葉枯病 斑点病	3000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	5回以内		5回以内(但し、定植前は1回以内)
たまねぎ	灰色かび病 小菌核病	2000～4000倍		収穫前日まで			
	灰色腐敗病	2000～3000倍	-	定植直前	1回	5分間苗根部浸漬	
	1000～2000倍	5分間土苗浸漬					
にんにく	黄斑病 さび病 葉枯病 白斑葉枯病	3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
にら	褐色葉枯病 さび病 白斑葉枯病			収穫前日まで			
ねぎ	黒腐菌核病 黒斑病 さび病 白絹病 葉枯病 小菌核腐敗病 小菌核病			1000倍			
		黒腐菌核病					

適用拡大登録月日：2025年04月09日

ファンタジスタ顆粒水和剤（ピリベンカルブ水和剤）

適用病害と使用方法

2025年4月9日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数
豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせい、そらまめを除く)	菌核病 灰色かび病	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
		64～128倍	6.4L/10a				
		32～64倍	3.2L/10a				
あずき	菌核病 さび病 炭疽病 灰色かび病	2000倍	100～300L/10a			散布	
		64～128倍	6.4L/10a				
		32～64倍	3.2L/10a				
いんげんまめ	菌核病 炭疽病 灰色かび病	2000倍	100～300L/10a			散布	
		64～128倍	6.4L/10a				
		32～64倍	3.2L/10a				
えんどうまめ	菌核病 さび病 灰色かび病	2000倍	100～300L/10a			散布	
		32～64倍	3.2L/10a				
		64～128倍	6.4L/10a				
そらまめ	菌核病 さび病 赤色斑点病 灰色かび病	2000倍	100～300L/10a			散布	

適用拡大登録月日：2025年04月09日

ファンタジスタ顆粒水和剤（ピリベンカルブ水和剤）

適用病害と使用方法

2025年4月9日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数	
そらまめ	菌核病 さび病 赤色斑点病 灰色かび病	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	
	菌核病 灰色かび病	64～128倍	6.4L/10a					無人航空機による散布
		32～64倍	3.2L/10a					
だいず	菌核病 灰色かび病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布 無人航空機による散布 散布		
		64～128倍	6.4L/10a					
		32～64倍	3.2L/10a					
	紫斑病	2000～4000倍	100～300L/10a					
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く)	菌核病 灰色かび病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布 散布		
		32～64倍	3.2L/10a					
		64～128倍	6.4L/10a					
えだまめ	菌核病 灰色かび病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布 散布 無人航空機による散布 散布		
		32～64倍	3.2L/10a					
		64～128倍	6.4L/10a					
	紫斑病	2000～4000倍	100～300L/10a					
さやいんげん	菌核病 炭疽病 灰色かび病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布		
	菌核病 灰色かび病	32～64倍	3.2L/10a					

適用拡大登録月日：2025年04月09日

ファンタジスタ顆粒水和剤（ピリベンカルブ水和剤）

適用病害と使用方法

2025年4月9日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数
さやいんげん	菌核病 灰色かび病	64～128倍	6.4L/10a	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
さやえんどう	菌核病 さび病 灰色かび病	2000倍	100～300L/10a			散布	
	菌核病 灰色かび病	32～64倍	3.2L/10a			無人航空機による散布	
未成熟そらまめ		菌核病 さび病 赤色斑点病 灰色かび病	64～128倍			6.4L/10a	
	32～64倍		3.2L/10a			無人航空機による散布	
きゅうり	菌核病 灰色かび病	2000～3000倍	100～300L/10a			散布	
		2000～3000倍				散布	
トマト ミニトマト	菌核病 すすかび病 灰色かび病 葉かび病 斑点病	2000～3000倍	100～300L/10a			散布	
						散布	
なす	うどんこ病 褐色円星病 褐紋病 すすかび病 ガリウム立枯病	2000倍	100～300L/10a			散布	
	褐色斑点病 菌核病 黒枯病 灰色かび病	2000～3000倍					

適用拡大登録月日：2025年04月09日

ファンタジスタ顆粒水和剤（ピリベンカルブ水和剤）

適用病害と使用方法

2025年4月9日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数
なす	褐色斑点病 菌核病 黒枯病 灰色かび病	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
ピーマン	黒枯病 斑点病	4000倍		収穫3日前まで			
はなやさい類	菌核病 黒すす病	3000倍					
キャベツ	株腐病 黒斑病 根朽病	2000倍					
	菌核病 灰色かび病	2000～3000倍					
はくさい	菌核病 黒斑病 炭疽病 白斑病	3000倍					
レタス	菌核病 灰色かび病	2000～3000倍					
	すそ枯病	2000倍					
非結球レタス	菌核病 灰色かび病	2000～3000倍	収穫14日前まで				
	すそ枯病	2000倍					
しそ	斑点病	3000倍	収穫7日前まで	2回以内	2回以内		
アスパラガス	褐斑病 茎枯病 斑点病		収穫前日まで	3回以内		3回以内	
くきちしゃ	灰色かび病		2回以内	2回以内			

適用拡大登録月日：2025年04月09日

ファンタジスタ顆粒水和剤（ピリベンカルブ水和剤）

適用病害と使用方法

2025年4月9日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数
いちご	炭疽病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	灰色かび病	2000～3000倍					
おくら	うどんこ病 灰色かび病 葉すす病	2000倍					
かんきつ	黒点病 そうか病 灰色かび病	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで			
	炭疽病(さび果)	2000倍					
なし	褐色斑点病 炭疽病	3000倍		収穫前日まで			
	黒星病 黒斑病 心腐れ症(胴枯病菌) 輪紋病	3000～4000倍					
りんご	うどんこ病 すす斑病 炭疽病	3000倍					
	褐斑病 黒星病 黒点病 すす点病 斑点落葉病 モリア病 輪紋病	3000～4000倍					
おうとう	黒斑病 褐色せん孔病 灰星病 幼果菌核病	3000倍					
もも	うどんこ病						

適用拡大登録月日：2025年04月09日

ファンタジスタ顆粒水和剤（ピリベンカルブ水和剤）

適用病害と使用方法

2025年4月9日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数	
もも	黒星病 灰星病 柿 ⁷ シ腐敗病	3000～4000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
初刈り	うどんこ病	3000倍						
	黒星病 灰星病 柿 ⁷ シ腐敗病	3000～4000倍						
小粒核果類(うめを除く)	黒星病 灰星病	3000倍			2回以内		2回以内	
うめ	黒星病 すす斑病 灰色かび病 灰星病							
ぶどう	うどんこ病 さび病				3000～4000倍		収穫14日前まで	3回以内
	晩腐病 黒とう病 灰色かび病							
ブルーベリー	灰色かび病	4000倍			収穫前日まで		2回以内	2回以内
かき	うどんこ病 炭疽病 灰色かび病 落葉病	3000～4000倍			収穫7日前まで		3回以内	3回以内
キウイフルーツ	すす斑病 灰色かび病	4000倍			収穫前日まで			
花き類・観葉植物(きく、トルコギキョウを除く)	灰色かび病	3000倍	100～300L/10a	発病初期	5回以内	5回以内		

適用拡大登録月日：2025年04月09日

ファンタジスタ顆粒水和剤（ピリベンカルブ水和剤）

適用病害と使用方法

2025年4月9日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数
きく	白さび病 灰色かび病	3000倍	100～300L/10a	発病初期	5回以内	散布	5回以内
トルコギキョウ	灰色かび病 斑点病						
茶	褐色円星病 新梢枯死症 炭疽病 輪斑病		200～400L/10a	摘採7日前まで	1回		1回

 適用拡大登録月日：2025年04月09日