

カンパネラ水和剤（ベンチアバリカルブイソプロピル・マンゼブ水和剤）

適用病害と使用方法

2024年8月28日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチアバリカルブイソプロピルを含む農薬の総使用回数	マンゼブを含む農薬の総使用回数
さといも	疫病	1000倍	100～300L/ 10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内	2回以内
		16倍	1.6～3.2L/ 10a			無人航空機による散布		
ばれいしょ		1000倍	100～300L/ 10a		5回以内	散布	5回以内	10回以内（ 但し、無人航空機散布は3回以内）
たまねぎ	白色疫病 べと病	750～1000倍			3回以内		3回以内	5回以内
ねぎ	黒斑病 べと病			収穫14日前まで				3回以内
きゅうり	褐斑病 べと病	1000倍		収穫前日まで				2回以内
かぼちゃ	疫病 べと病			収穫21日前まで				2回以内
すいか	褐色腐敗病			収穫7日前まで	5回以内		5回以内	7回以内
メロン	べと病			収穫前日まで				2回以内
トマト	疫病	750～1000倍		収穫前日まで	2回以内		3回以内	2回以内
キャベツ	べと病			収穫30日前まで				2回以内
はくさい		1000倍			1回		3回以内	1回
ぶどう	晩腐病 黒とう病 べと病		200～700L/ 10a	収穫45日前まで	2回以内			2回以内

適用拡大登録月日：2024年08月28日