

ツインターボ顆粒水和剤（クロチアニジン・イソチアニル水和剤）

適用病害虫と使用方法（側条施肥）

2021年10月27日現在

| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロチアニジンを含む農薬の総使用回数 | イソチアニルを含む農薬の総使用回数 |
|-----|----------------------------|----------|------|---------|-----------------------|---|---|
| 稲 | いもち病 イネミズウムシ イネトヨイムシ | 100g/10a | 移植時 | 1回 | ハート肥料に混合し側条施肥田植機で施用する | 4回以内（但し、直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内） | 3回以内（但し、直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内） |

ツインターボ顆粒水和剤（クロチアニジン・イソチアニル水和剤）

適用病害虫と使用方法（育苗箱灌注）

2021年10月27日現在

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロチアニジンを含む農薬の総使用回数 | イソチアニルを含む農薬の総使用回数 |
|--------|---------------------------|---|---------------------------------|------------|---------|------|---|---------------------------------|
| 稲(箱育苗) | いもち病 イネスズメムシ イネノメイシ | 高密度には種する場合は100g/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り5～10g（希釈倍数50～100倍）） | 育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り500ml | 移植3日前～移植当日 | 1回 | 灌注 | 4回以内（但し、移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内） | 3回以内（但し、移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内） |
| | | 100倍 | | | | | | |