

フルターボ箱粒剤（クロチアニジン・クロラントラニリプロール・イソチアニル・フラメトピル粒剤

適用表

2021年10月27日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数	クロラントラニリプロールを含む農薬の総使用回数	イソチアニルを含む農薬の総使用回数	フラメトピルを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病 白葉枯病 内穎褐変病 穂枯れ（ごま葉枯病菌） もみ枯細菌病 紋枯病 ウカ類 イネミズウムシ イネトコイムシ イネヒメハダカ コブノメイガ ニカメイチュウ フタオビコヤガ ツマゲロコハダ イネツトムシ	育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50g	移植3日前～ 移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する	4回以内（但し、移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内）	1回	3回以内（但し、移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内）	2回以内（但し、移植時までの処理は1回以内）
		高密度には種する場合は1kg/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50～100g）							

フルターボ箱粒剤（クロチアニジン・クロラントラニリプロール・イソチアニル・フラメトピル粒剤

適用表

2021年10月27日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数	クロラントラニリプロールを含む農薬の総使用回数	イソチアニルを含む農薬の総使用回数	フラメトピルを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)		高密度には種する場合は1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り50～100g)	移植3日前～移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する	4回以内 (但し、移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)	1回	3回以内 (但し、移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)	2回以内 (但し、移植時までの処理は1回以内)