

# ジャストフィットフロアブル（フルオピコリド・ベンチアバリカルブイソプロピル水和剤）

適用表

2024年9月18日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルオピコリドを含む農薬の総使用回数	ベンチアバリカルブイソプロピルを含む農薬の総使用回数
たまねぎ	白色疫病 べと病	3000倍	100～300L/ 10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
	べと病	24倍	1.6L/10a			無人航空機による散布		
きゅうり	白さび病 べと病	5000倍	100～300L/ 10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内(但し、灌注は1回以内、散布は2回以内)	3回以内(但し、灌注は1回以内、散布は2回以内)
はくさい				収穫7日前まで				
レタス	べと病	500倍	セル成型育苗トレイ1箱又はペ-パ-ポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当たり0.5L	収穫前日まで	2回以内	灌注	3回以内(但し、灌注は1回以内、散布は2回以内)	3回以内(但し、灌注は1回以内、散布は2回以内)
				定植前日～定植当日	1回			
非結球レタス	べと病	5000倍	100～300L/ 10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(但し、灌注は1回以内、散布は2回以内)	3回以内(但し、灌注は1回以内、散布は2回以内)
				定植前日～定植当日	1回	灌注		
バジル	べと病	5000倍	100～300L/ 10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内


適用拡大登録月日：2024年09月18日

# ジャストフィットフロアブル（フルオピコリド・ベンチアバリカルブイソプロピル水和剤）

適用表

2024年9月18日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルオピコリドを含む農薬の総使用回数	ベンチアバリカルブイソプロピルを含む農薬の総使用回数
ほうれんそう	べと病	5000倍	100～300L/ 10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
かんきつ	褐色腐敗病		200～700L/ 10a	収穫前日まで				
ぶどう	べと病			収穫30日前まで				

 適用拡大登録月日：2024年09月18日