

パディート箱粒剤（FMC旧製品）（シアントラニリプロール粒剤）

適用害虫と使用方法

2022年4月20日現在

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	イコ`類 イシマモク`リバ`エ	高密度には種する場合は1kg/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50～100g）	移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する	1回
		育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50g				
	ヒメヒ`ウカ	高密度には種する場合は1kg/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50～100g）	移植3日前～移植当日			
		育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50g				
イネス`ゾ`ウムシ イネト`オ`イムシ コブ`ノ`メイガ ニカメ`イ`チュウ フタホ`ビ`コヤガ ツマゲ`ロ`ヨ`コ`バ`イ イネツ`ムシ	育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50g	は種時（覆土前）～移植当日				
	高密度には種する場合は1kg/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50～100g）					

パディート箱粒剤（FMC旧製品）（シアントラニリプロール粒剤）

適用害虫と使用方法

2022年4月20日現在

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	イネミスヅウムシ イネトコイムシ コブノメイガ ニカメイトウ フタホビコヤガ ツマゲロヨコバイ イネツトムシ	高密度には種する場合は1kg/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50～100g）	は種時（覆土前）～移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する	1回
		育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50g	は種前		育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する	