

ベリマークSC (シアントラニリプロール水和剤)

適用害虫と使用方法

2019年9月25日現在

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数 |
|-------------|---|-------|---|------------|---------|------|------------------------------------|
| キャベツ | アブラムシ類 ウバ類 コナガ アザミウマ類 ハイマダラノメイガ ネキリムシ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ アオムシ | 400倍 | セル成型育苗トレイ1箱又はペ-ハ-ホ-ット1冊 (約30×60cm、使用土壌約1.5~4L) 当り0.5L | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 灌注 | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
| はくさい | アブラムシ類 コナガ カブラハバチ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ アオムシ | | | | | | |
| カリフラワー | コナガ ハスモンヨトウ アオムシ | | | | | | 1回 |
| ブロッコリー | アブラムシ類 コナガ アザミウマ類 ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ アオムシ | | | | | | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
| 非結球あぶらな科葉菜類 | アブラムシ類 コナガ | 4000倍 | 0.2L/m ² | 収穫7日前まで | | 株元灌注 | 1回 |
| いちご | アブラムシ類 アザミウマ類 ハスモンヨトウ | 1000倍 | 50mL/株 | 育苗期後半~定植当日 | | 灌注 | 4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内) |
| ほうれんそう | シロヒメノメイガ ハスモンヨトウ | 4000倍 | 0.2L/m ² | 収穫7日前まで | | 株元灌注 | 1回 |

ベリマークSC (シアントラニリプロール水和剤)

適用害虫と使用方法

2019年9月25日現在

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数 |
|---------------|---|-------|---|------------|---------|------|---|
| ねぎ | アザミヤ類 ハモグリバエ類 シロイロヨトウ | 400倍 | セル成型育苗トレイ1箱又は $1.5m \times 0.6m$ ポット1冊 (約 30×60 cm、使用土壌約1.5~4L) 当り0.5L | 育苗期後半~定植当日 | 1回 | 灌注 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内)) |
| | | 2000倍 | 0.5L/m ² | 収穫7日前まで | | 株元灌注 | |
| レタス 非結球レタス | アブラムシ類 ウワバチ類 ハモグリバエ類 オオタバコガ ヒメフタテンヨコバイ ハスモンヨトウ | 400倍 | セル成型育苗トレイ1箱又は $1.5m \times 0.6m$ ポット1冊 (約 30×60 cm、使用土壌約1.5~4L) 当り0.5L | 育苗期後半~定植当日 | | 灌注 | 4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |

ベリマークSC (シアントラニリプロール水和剤)

適用表

2019年9月25日現在

| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 希釈水量 | 使用量 薬量 | 使用時期 | 本剤の使用 回数 | 使用方法 | シアントラニプロール を含む農薬の 総使用回数 |
|--------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|-------------|------|---|
| きゅうり | アブラムシ類 | 400株当り2 ～20L (1株 当り5～50ml) | 400株当り25 ml | 育苗期後半～定 植当日 | 1回 | 灌注 | 4回以内 (但 し、定植時 までの処理 は1回以内、 定植後の散 布は3回以内) |
| | コナジラミ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 | 400株当り10 ～20L (1株 当り25～50m l) | | | | | |
| すいか メロン | アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 | | | | | | 1回 |
| トマト ミニトマト | アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 | | | | | | 4回以内 (但 し、定植時 までの処理 は1回以内、 定植後の散 布は3回以内) |

ベリマークSC (シアントラニリプロール水和剤)

適用表

2019年9月25日現在

| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 希釈水量 | 使用量 薬量 | 使用時期 | 本剤の使用 回数 | 使用方法 | シアントラニリプロール を含む農薬の 総使用回数 |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------|------|---|
| ピーマン | アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 | 400株当り10 ～20L (1株 当り25～50m l) | 400株当り25 ml | 育苗期後半～定 植当日 | 1回 | 灌注 | 4回以内 (但 し、定植時 までの処理 は1回以内、 定植後の散 布は3回以内) |
| なす | アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 ネキリムシ類 | | | | | | 1回 |
| ししとう | アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 | 400株当り10 L (1株当り2 5ml) | | | | | 4回以内 (但 し、灌注は1 回以内、散 布は3回以内) |