

ナエファインフロアブル（ピカルブトラゾクス水和剤）

適用表

2020年12月23日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピカルブトラゾクスを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	苗立枯病（ピシム菌）	1000～2000倍	育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り0.5L	は種時から緑化期	2回以内	土壌灌注	3回以内（但し、土壌混和は1回以内、土壌灌注は2回以内）
	苗立枯病（ピシム菌） 苗立枯病（リゾーフス菌） 苗立枯病（フザリウム菌）	2000倍	育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り0.5～1L	は種時			
	苗立枯病（リゾーフス菌） 苗立枯病（フザリウム菌）	1000倍	育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り0.5L				

ナエファインフロアブル（ピカルブトラゾクス水和剤）

適用表

2020年12月23日現在

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピカルブトラゾクスを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	ムレ苗防止	1000～2000倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5L	は種時から緑化期	2回以内	土壌灌注	3回以内(但し、土壌混和は1回以内、土壌灌注は2回以内)
	根の生育促進、移植後の活着促進	2000倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5～1L	は種時			
	ムレ苗防止						
	根の生育促進、移植後の活着促進	1000～2000倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5L	は種時から緑化期			