

パレード15フロアブル（ピラジフルミド水和剤）

適用病害と使用方法

2023年8月2日現在

作物名	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数		
かんきつ	黒点病	2000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内		
	そうか病 灰色かび病	2000～3000倍							
	灰色かび病	20倍	4～5L/10a			無人航空機による散布			
		40倍	8～10L/10a						
なし	赤星病 うどんこ病 黒星病 輪紋病	2000～3000倍	200～700L/10a	収穫前日まで		散布			
	褐色斑点病 黒斑病	2000倍							
りんご	赤星病	2000～3000倍							
	うどんこ病 褐斑病 黒星病 黒点病 すす点病 すす斑病 灰色かび病 斑点落葉病 モニア病 輪紋病								
	おうとう							灰星病	
								幼果菌核病	2000倍
	もも							うどんこ病 黒星病 灰星病	2000～3000倍
								果実赤点病	2000倍

パレード15フロアブル（ピラジフルミド水和剤）

適用病害と使用方法

2023年8月2日現在

作物名	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数
ネクリン	うどんこ病 黒星病 灰星病	2000～3000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
小粒核果類	黒星病 灰色かび病 灰星病(すもも) すす斑病(うめ)						
ぶどう	うどんこ病 褐斑病 黒とう病 さび病 灰色かび病	2000～3000倍		収穫7日前まで			
かき	うどんこ病 落葉病			収穫前日まで			
キウイフルーツ	灰色かび病						