

# フルスロツトル箱粒剤（シアントラニリプロール・トリフルメゾピリム・イソチアニル・ペンフルフ

適用病害虫と使用方法

2019年2月27日現在

作物名	適用病害虫	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数	トリフルメゾピリムを含む農薬の総使用回数	イソチアニルを含む農薬の総使用回数	ペンフルフェンを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 紋枯病 ウカ類 イネスズウムシ イネトコイムシ コブノメイガ ニカメイチュウ フタホシコヤガ ツマグロヨコバイ イネツトムシ	育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り50g	は種時(覆土前)～移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する	1回	1回	3回以内(但し、移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)	1回
	疑似紋枯症(赤色菌核病菌) 疑似紋枯症(褐色紋枯病菌) 内穎褐変病 穂枯れ(ごま葉枯病菌)		移植当日						

# フルスロツトル箱粒剤（シアントラニリプロール・トリフルメゾピリム・イソチアニル・ペンフルフ

適用病害虫と使用方法

2019年2月27日現在

作物名	適用病害虫	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数	トリフルメゾピリムを含む農薬の総使用回数	イソチアニルを含む農薬の総使用回数	ペンフルフェンを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	<small>                     葉枯病(赤色葉枯病)   葉枯病(褐色葉枯病)   内臓病(葉枯病)   穂腐れ(こま葉枯病)                 </small>	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g	移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する	1回	1回	3回以内(但し、移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)	1回