

ダニコングフロアブル（ピフルブミド水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年10月30日現在

作物名	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピフルブミドを含む農薬の総使用回数	
すいか メロン なす ピーマン	ハダニ類	3000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	1回	散布	1回	
しそ		2000倍		収穫3日前まで				
アスパラガス		2000倍	100～700L/10a	収穫前日まで	2回以内		2回以内	
しそ(花穂)			100～300L/10a	収穫3日前まで	1回		1回	
いちご		3000倍	2000倍	0a	収穫前日まで		1回	1回
みょうが(花穂)		2000倍			みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合 あつては開花期終了まで			
みょうが(茎葉)								
かんきつ	ミカンハダニ	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	1回	無人航空機による散布	1回	
		48倍	16L/10a					
		30倍	10L/10a					
		24倍	8L/10a					
なし りんご おうとう もも ネктリン	ハダニ類	2000倍	200～700L/10a	0a	1回	散布	1回	
小粒核果類								ナミハダニ
ぶどう								ハダニ類 ブドウヒメハダニ
いちじく								ハダニ類
かき								2000～4000倍

適用拡大登録月日：2024年10月30日

ダニコングフロアブル（ピフルブミド水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年10月30日現在

作物名	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピフルブミドを含む農薬の総使用回数
花き類・観葉植物	ハダニ類	2000倍	100～300L/10a	発生初期	1回	散布	1回
茶	カンザワハダニ	2000～4000倍	200～400L/10a	摘採7日前まで			

 適用拡大登録月日：2024年10月30日